

Verzeichniß für das Jahr 1870



Gemüse-Feld-u.Blumensamen,

Georginen, Gladiolen, Bäumen, Sträuchern, div. Pflanzen etc.,

welche in ächter und frischer Qualität zu bekommen sind

in der Gärtnerei und Samen- Sandlung

KLISSING SOHN in BARTH

Indem ich Ihnen mein diesjähriges Breis-Berzeichniß zur gefälligen Abnahme ber darin aufgeführten Arittel überreiche, benerke ich, daß die nachverzeichneten Sachen unter meiner Leitung auf das Sorgfältigste gedauet und angezogen werden, weehgald ich jedem meiner gechrten Abnehmer eine fireng reelle und prompte Bedienung zusächern lann. Hir das meinem Bater sein einer langen Relige vom Jahren geschenten Bertrauen
böllich da untend, ditte dieses mit auch ferner bewahren zu wollen. Sestaten Sie mit noch die Berficherung, das die plünktlich e. n. reellste Bedienung, auchber kleinken Aufräge mein Swundigs ist und bleiden wird.
Die Pereise sind in Pre ss. ourant, der Thaler 30 Sgr. — Das Gewicht ist Zollgewicht I Cenner – 100 Pfund – 1 Pfund – 30 Loth – 1 Loth – 10 Quentchen.
Die Berfendungen geschehen und Bestahr von geschen und Weckale ver geschäuten Aufrägeber, und werden sit Emballage nur die baaren Auslagen in Rechnung gestellt, welche ich jedoch siete durch Graifs-Beigaden zu decken
fünde. Wir noch unbekannte Aufrägegeber werden höslicht erfund; den Pereise siehen der und zu konnen und der nicht den konnen kannen der eine Graife Konnens-Unterschapen zu ermächtigen. Um recht deutliche Kannens-Unterschapen zu erwähnigen, der ermächtigen. Um recht deutliche Kannens-Unterschapen zu erwähnigen, der ermächtigen. Um recht deutliche Kannens-Unterschapen zu erwähnigen der keinen der kannens-Unterschapen zu erwähnigen.

genaue Angabe des Bohnorts, ber nächften Boft- ober Gifenbahnftation wird bringend gebeten.

Nüchenfränter.	àPfd. aL		Robfrabi in der Grde, Stedrüben oder		d. aLth				àLti gr.pf
				1		Rettig, rolemother dinefijder, jehr gart	1.91	-gr-	1)
Baffilfum, großer gröner Dill Esbragon (Pflanzen à Dhd. 6 [gr.) à Portion	-8-	6	Große glatte gelbe Schmalg-, fehr wohlfdmedend	1-1	0 8	" geichwänzter, Raphanus caudatus, mit 2-3	1		1
Esbragon (Pflanzen à Dhd. 6 igr.) à Portion	2	6	Gelbe rothgrauhäutige englische Riefen	1-1	0- 6	langen enbaren Schoten 3 Korn 1 Ger	-	-	35 -
Gartennelde große gelbe	6	6	Sehr große gelbe rothföpfige Laings Beiße pommeriche Kannen-, ichr empfohlen	1 1	8 1	Kopfialat.			1
Esbragon (Pflangen à Dib. 6 fgr.). a Portion Fendel, flier Botoquete. Gartenmelde, große gelbe Hittothe Jiop Mimmel Volle, Pfeifer oder Bohnentraut. Volle, pfeif gut (im September zu fänn). Sawendel oder Spife. Rajorau, franzischifter Stauden.	- 6-	- 6	Constitute statement, lest imposite		1-	Gute gelbe Ropffalate gemifcht	1_	16	- 1
Stop	1		Erreichen bei guter Cultur 2-3 guß im Umfang.			Früher gelber Steintopf, w S. Parifer Buder, fehr empfehlenswerth w. S.	-	24	1
Stille Referer oder Rohnenfront	- 7	10	White globe, weiße Angel	71	2 8	Muerfrühester hollandischer Broy geel, w. S	-	24	1
Rörbel, extra fraujer		- 8	Purple top, yellow Bullock, rothfäpfige gelbe Bullod.	-1	2 8	Korellen-Rolfblut, ertra, w. S	1	201	1
Körbelvfibe, fehr gut (im September gu faen)	1		Riiben.			Eropfopf, nen, diefer größte, gartefte it. banerhaftefte			
Majaran französischer Stanben	2/ 1	0	Mairiiben, friihe weiße plattrunde		2 0	aller Ropffalate fam nicht genug empfohlen werden, wegen feiner enormen Große eignet er fich nicht			
Beterflie, runie Alimeger Schults Beterflienwurzel, brige die Judes Borro, großer dispolitier Binter Borro, großer dispolitier Winter "" etwa großer Erabanter Winter	- 8 -	6	" " " Schneeball	- 10	10	zur Zwischencultur	2.		3-
Beterfilienwurzel, turge dide Buder	- 8-	6	Berbftruben, fleine lange weiße Teltower oder Marfifche	- 1:	2 1 -	Commer Endivien ober Bindfalat, gelber	-	-	1
Rorro großer dichalliger Rinter	- 8 -	6	" lange gelbe Bordtfelber	-10	0 8	Winter Endivien, grune traufe	-		1
" extra großer Brabanter Binter-	- 14 1		" weiße rothfopfige oder Stoppelribe " grüntopfige " "	- 8	6	Rabinschen oder Rapungel		8	
State over abelitable			Runfelriiben.			" ípanische, Tropaeolom majus	-	-	2 -
Rosmarin a Portion Salbei			Salb a. d. Erde wachschde rothe Riefen-Bfahl 100 W. 13 Re.	19.		Rern=Sorten.			
Sauerampfer, großblättriger non Belleville	_ 1	BU	Lange aus der Erde machiende rothe	TO SE	1 4	Gurfen, frühe furze Trauben, um jung einzumachen	-	25	1
Sellerie, ertra großer glatter Hamburger Anoll	- 24 1	6	" " " gelbe 100 %. 12 Be.	- 4	- 4	lange arine politragende	11	5	2 -
Bermuth, Artemisia Absinthium	1-1	6	Runde oder Klumpen, rothe			" " Schlangens, verbefferte	2		3 -
	_ 1		Bohls Riefens, rothe 100 %. 14 %.	- 8	- 4	" weige " alar any Olthan you	123	20	4-
Spinat.									
Großer rund- und breitblättriger	- 6-	6	Beete, blutrothe (jum Einmachen), rothe Nuttings selected dwarf, nenefeinftiel. Galat-	- 8	- 6	jehr empfehlenswerth	-		8 -
Meuleelander, Tetragonia expansa (muß in Topf oder	1		" buntelrothe plattrunde and Canpten. Aus-		1-	" neue ruffijde, fruheste ins freie Land " fürs Miftbeet, mehrere gute Gorten a Portion	-	25	2
Mifibeet ausgesäet werden)		1	gezeichn. nene Corte, i. Form b. Mairiibe gleichd.,			Melonen, aute Sorten füre Minbeet			2
Blumentohl.			gezeichn. nene Sorte, i. Form d. Mairsibe gleichd., Farbe sehr dunkel, i. Geschmack vorzügl., d. Sann.		4-	Melonen, gute Corten füre Mijtbeet " Speife Rurbis, großer Riden-	-	-	1 -
Bester früher afiatischer			find nur 1/3 fo groß wie die übrigen G		4-	größter Centner- Luft-, Bier- oder Figuren-Rurbis, in vielen Gor-	-	-	6 -
Spater Stadtholder, ausgezeichnet	6-	-1	Zwiebeln.			ten gemischt	-		3 -
Allerfrühester Erfurter Zwerg:, prima Qualität, acht	4		Große ftrohgelbe plattrunde harte breite hollandische, acht	- 25	1 6	Schal= oder Bahl=Grbien.			
			" filberweiße " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1-	1 6			5	
Weißer Kopffohl.					1 4	Früheste franz. Zwerg de Grace, 3/4 F. hoch (Burbaum) Daniel O'Rourke's, die früh. der jest bet. Erbi., 3 F. h.		4-	
Früher Porter, der beste frühe Kohl, auch häusig Zuder-	, ,		Stedzwiebeln.			(Suclide Pring Albert trith und idion 2 Tub hode	-	4 -	
hut genannt	1-1	6	Chalotten, weiße Berl- (nur v. Juli b. Octob. zu haben) gwohnliche gelbe Dyd.	7 2	1 6	Grinbleibenbe Caper, 3—4 Fuß hoch. Große Waterlow, ichr jüß, 5 Fuß hoch. Early Wonder, rüß nub volltragenb, 2½ Fuß hoch. Engl. grünbl. Non pareil. Knights Marrow, 3 F. hoch,	-	4-	
ipater ale der Porter	- 2	6	große dänische oder ruffliche		1 6	Early Wonder früh und politragend, 21/2 Tug hoch		5	
piger Buderhut	25 1	-	Kartoffelamiebeln, fehr ertragreich, 100 Stild 10 35. ",	1	1 6	Engl. grünbl. Non pareil, Knights Marrow, 3 &. hoch,		1	
Brofer plattrunder Magdeburger	- 25 1	6	Rnoblaud)		1 6	nusgeseidnete ipäte Sorte. Dwarf wihte Eugenie, 2 Huß hoch, idön Prince of Wales, neu, jehr reichtr., idön, 3-4 H. b., in hoch	-	6 -	+
Sorte für hiefiges Klima, wird in Große, Festig-					1 0	Prince of Wales new jehr reight iden 3-4 % h		6 -	
feit und Saltbarfeit von feiner andern übertroffen	1 15 2 -	-	Wurzeln oder Möhren.			" frühe Fairbairds, unvergleichliche, 4 guß hoch	_	6 -	
Rother Kopifohl.			Früheste allerkürzeste rothe Pariser Treib-Carotte Krühe seine kurze rothe hollandische Carotte, zum Treiben	- 20	1-	", frühe Fairbairds, unvergleichliche, 4 Huß hoch ", Laxtons early prolifix long pod, nene mittelfrühe reichtragendse und langischeigste Sorte, fann nicht genug empfohen werden		1	
Früher Erfurter blutrother	- 2		Jange rothe Brauniduneiger Corotte	10	- 10	fann nicht genna empfahlen merden		G	
Später hollandischer schwarzrother	1	6	" lange rothe Brannichweiger Carotte Gelbe Saalfelder oder Daifer Lange dide rothe. Rothe filhe Altringham	- 8	_ 6	" suprem. nene grüne Marferbse von			
Savoyer= oder Wirfingtohl.			Lange bide rothe	- 8	- 6	" " suprem. nen, griine Marferbse von schöner Qualität, mit sehr langen, grünen etwas gebogenen Schoten, trägt reichlich.			
Sans friiher frauser Ulmer	- 1	6	Reine nerhenerte grünfänfige Riefen- zum Seuttern	- 10	- 8	etwas gebogenen Schoten, trägt reichlich .	11.	5 2	. (
Bang früher frauser Ulmer	2-	-	Weiße verbesserte grünföpfige Riesen-, jum Futtern Betersilienwurzel, turze dide Zuder	- 8	_ 6	Buder:Grbien.			
Rosentohl.		1	große lange glatte	- 8	- 6	Frühe niedrige, sehr gut, 11/2-2 Fuß hoch	-	5 -	
Briffeler neuer niedriger, schön	-20 1	1	Bafilmafen, große lange glatte. – Scorzoner, Epargel ober Schwarzwurzel – Lichorien, echte bide Brannlchweiger –	1 10	1 8	", lange br. frummichal. od. engl. Sabel-, 4-5 g.h.	-	0	17
Blätterfohl.		1	Sichorien, echte dide Braunschweiger	- 10	_ 8	" große Schwert-, mit wachsgelben Schoten, 4 Fuß hoch	1	8	
	10		Radies und Rettig.			Stangen-Bohnen.			
Riedriger grüner extra frauser Winter	16 1	5	Runde furziantiae meine Manats	-11	8	Unn flahnen mar die Erndte durchschniftlich sehr gering madnet der			
		1	Runde furzlanbige weiße Monats " icharlachrothe M. " rosenrothe M. " " rosenrothe M. " " " " " " " " " " " " " " " " " "	- 15	1 -	Von Cohnen war die Erndte durchichnittlich febr gering, modurch der etwas höhere Preis wohl gerechtfertigt.		1	
Rohlrabi über der Erde.			" rosenrothe M	- 12 -	- 10	Allergrößte, vorzüglich lange gang breite weiße Schwert-	- 7	7 -	-
ang achter früher weißer feinblattriger Wiener Glas. 2 iber weißer englischer 1 uer blaner Riefen, fehr groß, bleibt ben ganzen Winter gart	2 6		" " D., unteres Knollenende weiß	15	1	Feine gelbe Bache-, gang ohne Fafern, m. fcmarg. Bohn.		1	
uer blauer Riefen:, febr groß, bleibt ben gangen	1 6	9	ange rosenrothe englische	-1101	1-	Diese Bohne führe i. Inter. mein. geehrt. Abnehm. nicht mehr, weil fie oft nur b. 4ten Theil gelbichot. Suljen			
Rinter part	_ 4	9	lettig, schwarzer runder Winter	10	0	bringt, empfehle daffir nachfiebende.	14	1	

Apfd. alth. thie.ge. gr. yis. Niefem: Inckerbrech mit wachsgelben Hilfen u. weisen Bohnen, felh und vorzäglich. Neue großehnen, felh und vorzäglich. Algier, feih und iche. Blaufchotige Speck, m. violetten Winnen u. Echoten, außerst belitat und sehe ertragrech. Große feine weiße Jucker der Butter. Bunte titrifice ober Butter. Bunte litrifice ober Ortholischen Prant. Arupz vder Buschühren. Große feine Jucker ober Butter, sehe ertragreich. Frise runde gelbe Parifer.	Apfd. alth. thir.gr. ys. 19- Augrefrüheste Variser Flageolet, ansgezeichn. 3. Brech. 6 Arnstheste neue weißigdatige, 8 Zoll hoch. 6 Arnstheste neue weißigdatige, 8 Zoll hoch. 6 Augrefreibeste neue weißigdatige, 8 Zoll hoch. 6 Augrefreibeste Nachen Stenen in der Witten. 4 Augrefreibeste Schwanelke's neuede Zuder-Verche, sehr zart, stüh und reichfregend	Gemischt zu danerhaltem seinen Gartenrassen à 100 % 15 % 6 — Aarrosseln. Karrosseln. Karrosseln. Karrosseln. Karrosseln. Karrosseln. Karrosseln. Karrosseln. Karrosseln. Kallen. Karrosseln. Kallen. Karrosseln. K
	Blumen-Samen	

Große feine Juders oder Butters, jehr ertragreich 5 5 5	Frühe niedrige Zwerg-Bufchel, 1 Tuß hoch	100 26, 20 36 0-
	Blumen-Samen.	
na bezeichnet foldhe, die im Topi ober Miftbeet erft at	togefäet werden milfen, t die als Topipflanzen behandelt, s Schlingt oder perennirende. Alle nicht bezeichneten kommen gleich an Ort und	oflanzen, e eignen fich zu Einfaffungen, z zweijährige, Stelle gefäet werben.
hav der grafen Menge Gammer-Glumen melde eriffiren, habe ich	nachstehend nur foldte aufgeführt, die wirkt al ichon lind, und he	the Babutu meinen gerheien zienesmeen vie ander
Ermuntert burch die vielen Anfragen nach Ne	nheiten in den letten Jahren, habe ich denn in die	fem Jahre auch keine Rosten gefchent und biete nach: als vorzüglich übergeben worden find. Die Befchreis
bungen find die der Herren Budter.	and Civili general, Lychically con the Grayana	
Neuheiten.	Berichiedene Sortimente von Blumen=Samen. 3Priss. Salbe Prijen u. halbe Sortimente tonnen nicht abgegeben werden. ger prig-	9
Adonio Cunaniana sine reisende siniahrige his 1 True hohe	A fer in 3 Fark Repette Chafeineare Amera	Truffaut's imbriquée pompon, gem. a 2th. 25 3gt 1 6
an Effect das Linum grandinorum rubrum hortitell, lou 3	1 " " 4 " " Sumbolot (beroeff, paomenoliningige robuste Zwergs)	in 4 Farben, jebe jeparat
Antifrinium majus fum inum Britant, in. verginger teath. ifigart, goldgelb u. weiß. Eine neue brillante Farbg. der besieden Tom Thumb Antirrh. 5— Artemisia judaica, m. herrliche Blattpfianze mit silbergrauer	1 " 3 " Biefen-Paonien-Perfections 12 6 1 " 3 " Bwerg Bictoria. 7 6 1 " Stetovia, febr vollfommen 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15	in 6 Farben, jede jeparat
Delphinium consolida fi. pl. var. Candelabrum. Diefer gang	1 " 12 " Reue Uhlands (paonienblüthige Augel) 10 -	in 8 Farben, jede jepardi
nene Zwerg-Ritteriporn ift jehr zu empfehlen. Die Pfianze	1 19	roth marmoriten Rinnen 1 6
Berüftlung dicht über d. Bod. zu einer gedrung, ihminett, geordn. Zwerg Pprantide v. faum 1/ Hohe n. eben solcher Breite. Die Blumen eben so saat Poole in Delph.	Truffaut's Imbrique Pompon 10	2IIIe Sorten gemifcht. h Lth. 16 Hr 6 Bidens astrosanguinea, m. nen, mit blutbraumen Blumen . 2 6
consolida Tarben diblan prolett role bellblan drettarb.	1 " 8 " Bwerg-Bouquet (Boltze) jehr verbessert. 7 6 - 1 " 6 " Neue großblumige Persection Igel 6 - 1 " 6 " gesüllte Reids auch Röhren-A.genaunt 5 -	Calcolaria hybrida, m.t. genindre il. gerigeret, vicel. Suice guine il. californica m. gelbe Bautorielbiume
neifi, jede à Prije 5 Ar., gemifdi 5 Ar. 1 Sortiment in obigne 6 Farben. Dianthus chinensis hybrida fl. pl. siderocaulis, m. Eijenfitel- neife. Dieje fidine Relfe bild. ein. compact. Jajon formitt.	Lev fo hen (Topfiamen).	Callirhouse pedata naza, m. injone utebr. purpurrothe Malbacee
neite. Drieg indice seite die eine eine eine eine eine eine eine	1 Sort. i. 36 Farb. engl. Sommer-Levl. ertra gef. à 100 Korn 35 — 1 " " 24 " " " " " " 100 " 22 6	Calliopsis Drummondu, ni. 21minibile Calliopsi Drummondu
Blum, jud v. ausgezeicht, zuug. n. 11 o. vereichezeiten Nuaucen des Roth, regelmäßiger dochgiseglörum. Bau 5 — "dentasus hybridus, m.p.e. fehr hübsche niede, reichblish.	1 " " 4 " " " " " " " 100 " 12 - " 12 " " 100 " 12 - " 12 " " 100 " 12 - " 12 " " 100 " 12 - " 100 " 12 - " 100 " 12 - " 100 " 12 - " 100 " 12 - " 100 " 12 - " 100 " 12 - " 100 " 1	Capsicum annuum, m. spanischer Pfesser in mehreren Sorten 1 — Cajaphora laterita, s.t.p. jokungenber ziegekrother Kadelräger 1 — 9
Barietät zu Einfassungen	4 ~ 1 C ~ X D. lalining consol of places Condolohyum 20	Celosia cristata nana, t.m. Zwerg-Sahnen-Ramm gemijcht. 1-
benenartig fich nach allen Seit, bin ausbreitet, ein, weiten	1 cort. 1. 6 kare. Depinitum consoli. pl., var. cametastram 20- 1 ", 8 Sort. Diant hus chinensis fl. pl	orntaurea depressa tosca de la loc, weige bijambuitende " 6 6 7 suaveolens, gelbe wohfriedjende 6 Centranthus macrosiphon fl. aloo, weige Balbrian 6 6 6 6 Centranthus macrosiphon fl. aloo, weiger Balbrian 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Gilia linifolia, neue Species, m. f. gefiedert. Belaub. m. groß. 3/4 3, i. Durchm. haltenden Blum, bildet d. Pflanze ein.	1 " 8 Farb. Phlox Drummondli, Flammenblume 7 1 " 4 Sort. Tagetes Studentenblume	Centranthus macrosiphon fi. aloo, weither Balbitant
mit insgangen gemat. Similar obstacta Schild. Gilla linifolia, neue Species, in. f. gefiebert. Schalb. in. groß. 34 S. t. Jurchin. Saltenben Schild. Similar etc. 9 S. hoh. n. chenjo breit. Suid, fept antibare cit. 10 June 1 June	" " Sarb Vinnia electron II no nom extra actilite 3 17	
Lobena pieta, m.e. in. steet ougetimen jujaci gesammen in berg	1 " "12 (d)onen Sorien Sommerstamen	cheiranthus annuus fl. pl., englische Sommer-Leukoie extra gefüllte i. vorzügl. Wischung,
"Quen of willes, m.e. rein weiße Barietät v. gedrungen. Budsse und reichstem Flor	1 " "12 " " " % of this outen 12 -	
Endyle u. jan ummerwahr. Flor. Aue 3 Gott. 3u meor.	1 " "12 " " Schlingpflanzen 10-	" " " großbl. engl. Sommer-Schojen errte gefüllte i. vorzügl. Widinung. Enpfiamen a 201. 1 A. 20 /vz. 1 3 i. 24 Karb. jede sparant 100 Roten. 1 6
Mimulus cupreus tigridioides a fond b.ano, m.e. Grundfarbe weiß, jammtigbraum getiegert u. gestedt, sehr feine Farbe Myosotis oblongata. Dieses empfehlenswerthe Bergismeinnicht	1 " "10 " Biergrafer, f. Bouq. 8. geeignet. Sort. 7 Acacia lophanta speciosa, t, Topipflatise	
tit t. allen jent. Theil. volutommener are aspesters. Ott	Acroclinium roseum, m. prächtige rothe Jumortelle	6 " " " nene immerblinende Sommer-
Oxalis tropaedoides vir dirol 1., m.e. Bau und Blätfen wie Oxalis tropaedoides nur mit glängend grüner Belandung, beshalb v. großem Werthe für die Teppinggartnerei 5 —		i. vorzügl, Middung 100 Korn. 1
Bifor, nur 8 3, b. u. 6 3, i. Durdin, gang confant in.	in brillanten Farben, giebt 5 % gefüllte	- früstischende, in hefter
bald roth m. weiß, bald fila m. weiß gesternt. V. f.efr reichol. 7 6. Drum. Heinholds, m.t. Neuer echter icharlachrother Pilor v. sehr nieder. compacten Wuchs, nicht variirend	Alyssum Benjhami (odorata) e.wolft. Ettirfrant a LM.8 m. – Alfthea 1989a fl. pl., p. ertra gef. engl. Walten eb. Etedfrei h. b. befter Karben gemidet h. LM. 12 m. 1. Amaranthus Melancholicus, m. mit blivether Belaubung 1	6 " " " Hille Tadyung 100 Korn 3 — " " " großftnaige Kaifer-Lenfloje ext. gefüllt in vorziglicher Mindung 2 6 " incanus " " nene Iverg Leiner-Lenfloren 3
Pyrethrum parthenifolium aureum, m.e. m. golbgelb. Matt. gang confant a. S., febr empfehlenswerth f. Teppidgärtn. 5—Reseda odorata grandiflora mehorata, t. Diefe neue Refeba	" tricolor. m.t.e. oretjaro. evenjans jajone Statipianse 1 -	ertra gef. 1. vorzugumitet within. 2 6
Reseda odorata grandistora meliorata. t. Dice neue Refeda hat sich i. vergang. Sommer als ganz verzigl. bewährt, sie it in. allen Theilen größer n. sind d. Bl. v. rothlicheter Farbe 2 6	Amobium alatum. m. weiße Immort, f. Wint, Bong, à LH, 5 Hr. Annagallis grandiflora, e. gemischt. 1 Antirrhinum majus, grß. Löwenmant i. fc. ön. Frb. gem. à LH, 5 Hr. —	Chrysanthemum carinatum coccuneum, m. prachivolli.verichied.
haben die gang eigenthümtliche branne Karbe, unter der	" meinersoni, 2: nen, ounterrola nut teus beinem Schlund 5-	Dunettii fi. pl., nene gef. Budgerbi.
Benenung Bismarek befannt	" Tom Thumb, z.e. neu, ein nicht üb. 6 3 off hober Townmant i. folgend. Sorten: lencht, chinober, Deltla, album rubrum	" venustum m. purpurjarbige " " Cinperaria hybrida nana, m.t. neue Zwergs von compactem
mäß.geformt. Plum., wov. jed. einz. Pl. nt. e. fraft. Fleedgez. 19 5— " cornuta alba, m.p.e. weißblishendes Beilchen 5— " utea, m.p.e. gelbblishendes Beilchen 5—	striatum. Henry IV., fl. aibo, z. neu, reinweißeBariet.,sulphureum,schwefel-	Ruchs, nur von Rangolimen. Clarkia nerillora il. pl., e. gefüllte olcanderblüthige Clarfie. " puloherrina, e. nene brillant carmurche. " 6
"Mouve Ausen-Purple Quen, Diandills, Belich, iedes 5- "Obige 4 Gorten Viola cornuta find perennirend, bliften b. gaugen Sommer febr reicht, u. können nicht genug empfohien	Aquilegia Durandii, fl. pl., p. geftreite Aquilegia	Clintonia pulchella, m. zierliche Clintonie, indin
merben sowohl zu niedr. Gruppen wie zur Teppichgartnerei. Xeranthemum annuum imperialis, fl. pl., m. die schonfte dieser	" spec. St. Petersburg, m. neu, 4-5' hohe prachtige pramibenformige Decorationspilanze	6 Colinsia bicolor major, zweijarvige Collinjia a 2th. 4 Ign 6
Sattung, von einer prachtvoll glänzend purpurwiofetten Karbe, ganz constant, gleich empfehlenswerth für Gruppen wie für Vonquetbinderei	Asperula azuren setosa, nen, me. wird nur 1' hoch u. bringt eine Fille lichtblauer wohlriechender Blüthen	6 Convolvulus tricolor a niebr Rinde i. 3 Sort iede à 4th 3 /ar. 6
Zea spee. graeillima, m. diefer ffeinste gierlichste Mais erreicht nur eine Sobe v. 2-21/2 Ruß, ift v. gebrung, graeissen	Aster chinensis fl. pl. (Kolgende After-Sorten sind schön gefällt und rein in Farben.)	Coreopsis cardamiri dia astrosa: guinea, in b. indicate Cectori. "tinctoria und nana m. in 4 iddenen Sorten
Habitus, In Nordoutschland bringt diese Sorte feine Blitth, wodurch d. friiche Ausel, d. gang. Sommer erhalt, bleibt Zinnia, elegans pumila, fl. pl., varietatis, m. diese Varietät	Schiller-Affer, nen. Jebe Pflange bilbet ein geichloffenes puramibenformiges Bouquet. Die Blum, find fein, gierl.	Cucurbita Melopeppo, m.s. Lufte, Zier- oder Figuren-Kürbis
nor offen ühr. 3. aus. erreicht nur e. Söhe v. 1—11/4 %. 2 6	n. dicht gefüllt (Dippe), weiß, dunkelcarmin mit weiß, jebe a 20e. I Re. 1 Aenesse Zwerg Victoria-Asser, schneeweiß, dunkelblau,	Angora, m.s. febr ichnellwüchfig zur Bekleidung b.
", elegans tägetæflora fl. pl., m. neue gefüllte sammetblum. in Farbe ebenso verschieden wie Zinnia elegans 2 6 Reneste Humboldt-After, (verbesserte pronienblith, robuste	carminrofa, jede à Prife 3 Fpr., gemischt	8 grossularia, m.s. Stadjelbeer-Kürbis, sehr zierlich grossularia, m.s. Stadjelbeer-Kürbis, sehr zierlich " leucantha longissima, m.s. trägt mehrere Kuß
Bwergs mir 1 & h., if durch ihren gefallig. Butis worth ber Zwerg-Bouquet-Phramiden-After vorzuziehen. Die groß.	carminrofa, bunfetblau ni weiß, hellblau, rein weiß, lila- rofa, carmoifin ni-weiß, carmoifin, hellblau ni weiß, hor- tenfienroth, rein ottblau, pfürfichblüthen, jebe à Pr. 3 492.	Lange Friighte, zur Befleibung von Lauben
3ahîr. Slum. find extra gefülft u. päonienblith, getrag. v. 6 J. lang. Stielen. Gedrung. Wachs, frijde Belaub. find noch befonders hervorzuheben. Weiß, carmoifin mit weiß,	gemijdht à Lth. 2 Re. 2 2 Gemijdht à Lth. 25 Re. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 (Borstehender G. Same ift nur von den allerichonften Sorten
bunfelviolett, hodprofa, jede feparat	fchneeweiß, lebhaft roja m. weiß umflort, roja m. weiß,	meines bekannten Sortiments gewonnen.) Datura fastuosa Huberiena. m. neuer Stechahzel m. gel. Bl. 1 6 Delpinium ajacis hyacinthisforum fl. pl. niebe. erren gefüllt. Ritteriporu, in bester Wildung å <i>II</i> , 4 hyr. 6
gattung ibertrepen noch d. Große d. Arten Aufgewährt, find dabei vollkomm. gefüllt u. päonienart. hoch gewölbt.	briffant lila, hellblau m. weiß, delblau, rothviolett m. weiß, neu, carmin m. weiß, neu. Jede Farbe jeparat	consolida H. Di., erred defiliter ceptolett otticeip.
Priante verzweigt und mit, putantorenhour ver 172 3-25- brillantroja, vola mit meiß, belivolett, jede jeparat	gemischt à <i>Bh.</i> 25 <i>Ig</i> u. weiß nach unen rosa Schein, hellbsan m. weiß, rein weiß, decrunoisn, hellbsan, descarnin, delbsan men, violett m.	formourn n mayor infort
ihönfte Zwerg A. bezeichnet. Die Pflanze bilbet einen 10—12 Z. i. Durchn. haltend. Buid v. nur 3 Z. Söbe, ift ungemein reichbligt, Blum. bicht gef., dachziegelformig	weiß, lebhaftroia m. weiß umflort. Jede Farbe feparat 1 Paonienbl. Byramiden-After (Truffout's) gem. à Lth. 20 1/32. 1	3 pigriegns, auffällig tief buntle Rarietat . 12 6
in friguirt, kilblan, carmoifin, weiß in cermoifin, jede ieb. Vorstehende 48 Keuheiter gebe ich a Brife ab für 4 Az. 20 Sort, nach meiner Wahl für 2 Az. 8 Sort, desgl. für 1 Az.	in 24 Karben, jede jeparat 1 Großbinm.drviauthemumbl. Zwerg-After gem. à 206. 25 gr. 1	6 "carlophyllus fl. pl., z. ertra gefüllte Melfen I. B. 2 6 3 "chinense fl. pl., m.z.e. gefüllte Chimerer Melfe, geninfit
20 Gort, nach meiner Bahl für 2 Rg. 8 Gort, desgl. für 1 Ag 1	in 12 Farben jede separat 1	anjustrictiva zee v ogu (1

	à Pri			
at the attended attended to the hadrothe.	gr. p	19.	Sel	ıvz
Dianthus chinense fl. pl. atropurpureus, m.z.e. hodrothe. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	1	6	Sec	
			Ser	iec:
" nen, in brillanten Farben, weiß gefäuntt u. getuicht gleich den ichottiiden Federunften	1 1	6	Sil	ene
Heddewigii, m.z.e. nene practiv. Riej R. hybrida fl. pl., m.z.e. gefüllte	1	6	Sic Sol	yos
Laininto man a comed Wiei 92	1	6	Sta	tic
" diadem Are Bei de diadematus fi. et. in z.e. Piadem Areffic, ete. I finnen gut gefüllt, diadem artig gesichnet, nicht gang confiant. Dodecatheon Me.dia, z.e. 6" hohe reignbe Gotterblunte. Flichtysam bratestum luteum fi. eln. m. gef. gelbe Erroblumu				"
artig gezeichnet, nicht ganz confiant	5	6	Ste	"evia
Elichrysum bractatum luteum fl. pl., m. gef. gelbe Strohblume Borossorum rex fl. pl., m. rein weiße	1	6	Sti	ipa
Borossorum rex îl. pl., m. rein weißt monstroesum fl. pl., m. gefüllt ir ichonen duntlen Farben	1		Ta	rep
	1	6		"
" gefüllte prächtige bunkelrothe	1	6		" iun
Excremocarpus scaber (Galampelis punicus), m s.p. praditu	1	10	Tr	opi
Emilia sammea, m. renerrothe Emilia sacana) Excremocarpus scaber (Calampelis punious). m s.p. pradiu scale s	1			
" crocea dentata, nen, die Blumenblätter gefrang	, ,			
" crocea uentit. L'igenidati fidi am Morn) ; iditri Gailardia piet, marginata, m. meiti geranete Gailardie. Gilla capitata fl. coerulea, blane Gille Gladiolus gandavensis, m. idine Gorten gemijdit. Gloxinia hyorida & erecta, m. t. idionifen Gorten. jede Garanbare, dabaga m. Suncfangranti, neridischen. jede	1			
Gladiolus gandavensis, m. jone Sorten gemijcht	62	2 6		
	, .			
Gypsophilla elegans, icone Schleierblume, unentbehrlich	-	6		
" rosea, rojenrothe für paniculata, p. rispenblüthige Bonquets	1	1 6	V	erb
	4 -	- 6		iola
finme. finme. finme. Helychrysum brachyruchum, m. prädtige gelbe Etrobbium. Hesperis tristis z. graue wohfried, Raduviele ž. L.M. 4 ½. Iberis, e. Editeienbiume in 5 Sorten, weiß, mohlried, weiß. Impatiens Balsamina fl. pl., m. bidgefüllte a ZM. 18 ½. Rojen- ob. Andrieux-Baljaminer i. z. befre Wildiam.	2 -	- 6		1013
Iberis, e. Schleifenblume in 5 Sorten, weiß, wohlriech. weiß	2,	- 6		
Impatiens Balsamina fl. pl., m. bidytgefillte a Lth. 16 19	0	1-		
		2 6		
atrosanguineum plenissimum, neu n. schön. gefüllte Zwerg Basiaminen. a 2th. 18 1. Ipomaea coccinea, m.s. zierl rothe Binde, z. Bild. v. häng. Gnirin		1 6		euh
		2	, ou	lbe
Isolopis graeilis, m.t. jehr zierliches Ercos für Ampela Lathyrus odoratus, s. wohlt. Bide, gem. a Lell. I hinaria alpina, m.e. blanvlühendes Klachstrant	ē	1 (
" binartia spiendens, pullicipiotenes		- :	12	Still
" cymbalaria, m.t. für Ampeln u. Steinparthien iche " Hendersonii, duntetviolett, reichblilhend, ichr ichon .		2 _	50	22 22 22
tristis, p.e. niedliche buichige Linum grandiflorum rubrum, prächtig rothblichender Lein		1 -		"
Lobelia E inus, e.m. fleine blane Lobelie		1_	6	
" eymoateria, m.t. pir einheit al. ettenbattige von " Hendersoni, buttetuielet, reithfelbene, che floor " tristis, p.e. nieolide buidige Louis grandiforam rubram, produig reithfelbene Lein. Lobelia E inus, e.m. fleine blane Lobelie " grandifs erecht, k.m.e. aufrechtiebenbe Lobelospermum scandens, mts. rothe flimmende Rammfamu Lupinus albus coccineus. 2 Rub hoft, referent umb weit " hybridus insignis, rothfide Kupine " Mearicsii wagdungf handenfe Lupine	ft.	-10	6	
" hybridus insignis, röthliche Lupine		1-	6	
"Henziesii, yüniyusi yödiyise enyid Faricidi. "Exans Illadinus, ener lidariben Baricidi. " polyphyllus, p. in perfdiebenen Karben Lyohnis Haceann hybridia, p. Edmenlet in idanen Karben Manrandin Barkleyana, m.», iyel veidölüh, Edinugik Martynila formosa, in. roljölihjenber Elephanici Miljel.	::	2 - 1 -	er er	hält
Lychnis Hageana hybrida, p. Lichtnelle in ichonen Farben Maurandia Barkleyana, m.s. zierl reichblith. Schlingpil. ger	1.11	1 1 1	011 61	empi det i
Martynia formosa. m. rothblithender Clephanten Rupel Matricaria capensis eximea fl. pl., rein weiße gef. Matrico	rie	1 .	6 1	11) 14
Matricaria capensis eximea d. pl., rein weife grf. Warrico Mesembrianthemum crystallinum, m. fryjadifure Giepfia finosa pudica, t.m. Gimpfianse ob. Rühr' mid, nicht an Mimotsa cardinelie. zw. Gauffreiburg ob. Rühr' mid, nicht an Mimothe cardinelie. zw. Gauffreiburg ob.	e a	1 2		
Mimosa pudica, t.m. Sinnpflanze od. Rühr' mich nicht au Mimulus cardinalis, m.p. Gantlerblume				
		1		
" cupreus, m.p. neue scharlachrothe Gautserblume . hybridus tigrinoides, m p. prachtvoll getigert u. g	eft.		6	
" cupreus, m.p. neue icharlachrothe Gantlerblume . " hybridus tigrinoides, m.p. prachivoll getigert u. g	efl.	1 2 1 5	6	
" cupreus, m.p. neue icharlachrothe Gantlerblume . " hybridus tigrinoides, m.p. prachivoll getigert u. g	efl.	1 2 1		
" cupreus, m.p. neue icharlachrothe Gantlerblume . " hybridus tigrinoides, m.p. prachivoll getigert u. g " fl. pl., neu, wie vorstehe	efl.	1 2 1 5 1 1	6 6	
" cupreus, m.p. neue idjarfadjvothe Gautterbunue. " hybridus tigrinoides, m.p. prantivol gerigeru, g. " fl. pl., neu, wie vorftebe. " aber mit boppeften 31	eff. ide iet. it. d)t	1 2 1 5 1 1 - 2	6 6 6	
" oupreus, în.p. neue icharlachrothe Gautterbunut: " hybridus tigrinoides, în p. prațivolă gerigeru, g. " " " fl. pl., neu, vie vorteței aber nit doppeffeu Bl. " quinquevulnerus maximus, în.p. filații.licion. Sar Mirabilis jalappa. în. vocții crețeie Bunderbunute, genției Myosotis alpestris fl. albo, z. weighinetine Sergițimeniu " fl. coerulea, z. blaublic, Sergițimeniu a 2%, 5 " azorica alba, în.e. reiu weige lety ichone Ruchei. " " coelestina, lety letyne fijunutiblaue "	eff.	1 2 1 5 1 1 - 2 2	6 6 6	23 evft
" oupreus, în.p. neue icharlachrothe Gautterbunut: " hybridus tigrinoides, în p. prațivolă gerigeru, g. " " " fl. pl., neu, vie vorteței aber nit doppeffeu Bl. " quinquevulnerus maximus, în.p. filații.licion. Sar Mirabilis jalappa. în. vocții crețeie Bunderbunute, genției Myosotis alpestris fl. albo, z. weighinetine Sergițimeniu " fl. coerulea, z. blaublic, Sergițimeniu a 2%, 5 " azorica alba, în.e. reiu weige lety ichone Ruchei. " " coelestina, lety letyne fijunutiblaue "	eff.	1 2 1 5 1 1 - 2 2	6 6 6 6 6 6 6	erst Na
" oupreus, în.p. neue icharlachrothe Gautterbunut: " hybridus tigrinoides, în p. prațivolă gerigeru, g. " " " fl. pl., neu, vie vorteței aber nit doppeffeu Bl. " quinquevulnerus maximus, în.p. filații.licion. Sar Mirabilis jalappa. în. vocții crețeie Bunderbunute, genției Myosotis alpestris fl. albo, z. weighinetine Sergițimeniu " fl. coerulea, z. blaublic, Sergițimeniu a 2%, 5 " azorica alba, în.e. reiu weige lety ichone Ruchei. " " coelestina, lety letyne fijunutiblaue "	eff.	1 2 1 5 1 1 - 2 2	6 6 6 6 6	Ma die
" cupreus, in.p. neue icharlachrothe Gautterbunne: " hybridus tigrinoides, mp. prachivol gerigeru. g " fl. pl., neu, wie vorliebe, " aber mit boppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " aber mit boppelen 31. " guinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " azoriea alba, t.e. teitu weige ichr ichone Stengimunum " coelestira, ichr ichone binunciblane ," coelestira, ichr ichone binunciblane ," " coelestira, ichr ichone binunciblane ," insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" ramboiles alba ousiata, e. neu. 8. Dittie flow nit weißer llumännung, b. Rarb. Beruß, rew Miootiana macronlyish a quae tes, m. eine Zabodrore mit breit, u. 3 (ang. Stättern, majetat. Stattpfo	eff. iet. dyt. lyz. lyz. nara	1 2 1 5 1 1 - 2 2 - 1	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Na die Ma 41.
" cupreus, in.p. neue icharlachrothe Gautterbunne: " hybridus tigrinoides, mp. prachivol gerigeru. g " fl. pl., neu, wie vorliebe, " aber mit boppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " aber mit boppelen 31. " guinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " azoriea alba, t.e. teitu weige ichr ichone Stengimunum " coelestira, ichr ichone binunciblane ," coelestira, ichr ichone binunciblane ," " coelestira, ichr ichone binunciblane ," insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" ramboiles alba ousiata, e. neu. 8. Dittie flow nit weißer llumännung, b. Rarb. Beruß, rew Miootiana macronlyish a quae tes, m. eine Zabodrore mit breit, u. 3 (ang. Stättern, majetat. Stattpfo	eff. iet. dyt. lyz. lyz. nara	1 2 1 5 1 1 - 2 2 - 1	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	na die Ma die 41.
" cupreus, in.p. neue icharlachrothe Gautterbunne: " hybridus tigrinoides, mp. prachivol gerigeru. g " fl. pl., neu, wie vorliebe, " aber mit boppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " aber mit boppelen 31. " guinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " azoriea alba, t.e. teitu weige ichr ichone Stengimunum " coelestira, ichr ichone binunciblane ," coelestira, ichr ichone binunciblane ," " coelestira, ichr ichone binunciblane ," insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" ramboiles alba ousiata, e. neu. 8. Dittie flow nit weißer llumännung, b. Rarb. Beruß, rew Miootiana macronlyish a quae tes, m. eine Zabodrore mit breit, u. 3 (ang. Stättern, majetat. Stattpfo	eff. iet. dyt. lyz. lyz. nara	1 2 1 5 1 1 - 2 2 - 1	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	90 a bie . Mi 41. 42.
" cupreus, in.p. neue icharlachrothe Gautterbunne: " hybridus tigrinoides, mp. prachivol gerigeru. g " fl. pl., neu, wie vorliebe, " aber mit boppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " aber mit boppelen 31. " guinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " azoriea alba, t.e. teitu weige ichr ichone Stengimunum " coelestira, ichr ichone binunciblane ," coelestira, ichr ichone binunciblane ," " coelestira, ichr ichone binunciblane ," insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" ramboiles alba ousiata, e. neu. 8. Dittie flow nit weißer llumännung, b. Rarb. Beruß, rew Miootiana macronlyish a quae tes, m. eine Zabodrore mit breit, u. 3 (ang. Stättern, majetat. Stattpfo	eff. iet. dyt. lyz. lyz. nara	1 2 1 5 1 1 - 2 2 - 1	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	erst Ma bie . Mi 41. 42. 43.
" cupreus, in.p. neue icharlachrothe Gautterbunne: " hybridus tigrinoides, mp. prachivol gerigeru. g " fl. pl., neu, wie vorliebe, " aber mit boppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " aber mit boppelen 31. " guinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " azoriea alba, t.e. teitu weige ichr ichone Stengimunum " coelestira, ichr ichone binunciblane ," coelestira, ichr ichone binunciblane ," " coelestira, ichr ichone binunciblane ," insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" ramboiles alba ousiata, e. neu. 8. Dittie flow nit weißer llumännung, b. Rarb. Beruß, rew Miootiana macronlyish a quae tes, m. eine Zabodrore mit breit, u. 3 (ang. Stättern, majetat. Stattpfo	eff. iet. dyt. lyz. lyz. nara	1 2 1 5 1 1 - 2 2 - 1	- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	erst Ma bie . M. 41. 42. 43. 44.
" cupreus, in.p. neue icharlachrothe Gautterbunne: " hybridus tigrinoides, mp. prachivol gerigeru. g " fl. pl., neu, wie vorliebe, " aber mit boppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " aber mit boppelen 31. " guinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " azoriea alba, t.e. teitu weige ichr ichone Stengimunum " coelestira, ichr ichone binunciblane ," coelestira, ichr ichone binunciblane ," " coelestira, ichr ichone binunciblane ," insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" ramboiles alba ousiata, e. neu. 8. Dittie flow nit weißer llumännung, b. Rarb. Beruß, rew Miootiana macronlyish a quae tes, m. eine Zabodrore mit breit, u. 3 (ang. Stättern, majetat. Stattpfo	eff. iet. dyt. lyz. lyz. nara	1 2 1 5 1 1 - 2 2 - 1		90 a bie . Mi 41. 42. 43. 44. 45. 46.
" cupreus, in.p. neue icharlachrothe Gautterbunne: " hybridus tigrinoides, mp. prachivol gerigeru. g " fl. pl., neu, wie vorliebe, " aber mit boppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " aber mit boppelen 31. " guinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " azoriea alba, t.e. teitu weige ichr ichone Stengimunum " coelestira, ichr ichone binunciblane ," coelestira, ichr ichone binunciblane ," " coelestira, ichr ichone binunciblane ," insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" ramboiles alba ousiata, e. neu. 8. Dittie flow nit weißer llumännung, b. Rarb. Beruß, rew Miootiana macronlyish a quae tes, m. eine Zabodrore mit breit, u. 3 (ang. Stättern, majetat. Stattpfo	eff. iet. dyt. lyz. lyz. nara	1 2 1 5 1 1 - 2 2 - 1	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	erst Ma bie . M. 41. 42. 43. 44.
" cupreus, in.p. neue icharlachrothe Gautterbunne: " hybridus tigrinoides, mp. prachivol gerigeru. g " fl. pl., neu, wie vorliebe, " aber mit boppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " aber mit boppelen 31. " guinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " azoriea alba, t.e. teitu weige ichr ichone Stengimunum " coelestira, ichr ichone binunciblane ," coelestira, ichr ichone binunciblane ," " coelestira, ichr ichone binunciblane ," insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" ramboiles alba ousiata, e. neu. 8. Dittie flow nit weißer llumännung, b. Rarb. Beruß, rew Miootiana macronlyish a quae tes, m. eine Zabodrore mit breit, u. 3 (ang. Stättern, majetat. Stattpfo	eff. iet. dyt. lyz. lyz. nara	1 2 1 5 1 1 - 2 2 - 1	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	90 a bie . Mi 41. 42. 43. 44. 45. 46.
" cupreus, in.p. neue icharlachrothe Gautterbunne: " hybridus tigrinoides, mp. prachivol gerigeru. g " fl. pl., neu, wie vorliebe, " aber mit boppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " aber mit boppelen 31. " guinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " azoriea alba, t.e. teitu weige ichr ichone Stengimunum " coelestira, ichr ichone binunciblane ," coelestira, ichr ichone binunciblane ," " coelestira, ichr ichone binunciblane ," insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" ramboiles alba ousiata, e. neu. 8. Dittie flow nit weißer llumännung, b. Rarb. Beruß, rew Miootiana macronlyish a quae tes, m. eine Zabodrore mit breit, u. 3 (ang. Stättern, majetat. Stattpfo	eff. iet. dyt. lyz. lyz. nara	1 2 1 5 1 1 - 2 2 - 1	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	90 a bie 142. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
" cupreus, in.p. neue icharlachrothe Gautterbunne: " hybridus tigrinoides, mp. prachivol gerigeru. g " fl. pl., neu, wie vorliebe, " aber mit boppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " aber mit boppelen 31. " guinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " azoriea alba, t.e. teitu weige ichr ichone Stengimunum " coelestira, ichr ichone binunciblane ," coelestira, ichr ichone binunciblane ," " coelestira, ichr ichone binunciblane ," insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" ramboiles alba ousiata, e. neu. 8. Dittie flow nit weißer llumännung, b. Rarb. Beruß, rew Miootiana macronlyish a quae tes, m. eine Zabodrore mit breit, u. 3 (ang. Stättern, majetat. Stattpfo	eff. iet. dyt. lyz. lyz. nara	1 2 1 5 1 1 - 2 2 - 1		90 a bie
" cupreus, in.p. neue icharlachrothe Gautterbunne: " hybridus tigrinoides, mp. prachivol gerigeru. g " fl. pl., neu, wie vorliebe, " aber mit boppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " quinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " aber mit boppelen 31. " guinquevulnerus maximus, m.p. fluifil.ichon. 32. " azoriea alba, t.e. teitu weige ichr ichone Stengimunum " coelestira, ichr ichone binunciblane ," coelestira, ichr ichone binunciblane ," " coelestira, ichr ichone binunciblane ," insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" insignis, e. beliebts himmelol. kiebeshaim a 27/4. 2 (" ramboiles alba ousiata, e. neu. 8. Dittie flow nit weißer llumännung, b. Rarb. Beruß, rew Miootiana macronlyish a quae tes, m. eine Zabodrore mit breit, u. 3 (ang. Stättern, majetat. Stattpfo	eff. iet. dyt. lyz. lyz. nara	1 2 1 5 1 1 - 2 2 - 1		erst 92a die
" bypridus tigrinoides, m. p. practivoid genigeru, g. " " bypridus tigrinoides, m. p. practivoid genigeru, g. " " aber mit boppeften 34. " quinquevulnerus maximus, m. p. flatfi. Lifdon, 38ar " Mirabilis jalappa, m. wohitrichene Suntherofune, gemijd Myosotis alpestris fl. albo, z. weitbühlenbes Sergijmennid appear, m. wohitrichene Suntherofune, gemijd Agoria albe, t.e. tein weits febr ichone Stentis albe, z. z. baublih, Sergijmennidid a 276, 5 " " coereles, z. baublih, Sergijmennidid a 276, 5 " " coereles, z. baublih, Sergijmennidid a 276, 5 " " coereles z. baublih, Sergijmennidid a 276, 5 " " coereles z. befieber Suntendel zichespina a 276, 2 " " coereles ina, ich johne bimmelok zichespina a 276, 2 " " coereles ina, ich johne bimmelok zichespina a 276, 2 " " coereles ina, ich johne simmelok zichespina a 276, 2 " " sentende amaseona, Sungire im Gehiten. " ana fl. pl., stete nicht, gd. a 226, 5 " " hispanica purpurea, sentender albeit, gd. " somniferum d. pl., gd. Randiferte. " Somniferum d. pl., gd. Randiferte. " somniferum d. pl., jchon gd. Garten Blein, gd. " paeconiforum fl. pl., gd. ponenchildi. Mehn, g. " penstemon Hartwegi, m.p. in biserien Sorten geniidat. Perilla nankienasis, m. präntige ichwaspisame Siattyli Petunia hybrida, m. Setunien i. b. bejten griimranb., gdab gefferieten, weigliefigien Sorten gemiidat. " Gonnens and sorten gemiidat. " Gonnens and sorten gemiidat. " Babellina, gdf. gibe a " perenna hybrida, p. in idonine Sorten gemiidat. Perenna hybrida, p. in idonine Sorten gemiidat. " perenna hybrida, p. in idonine Sorten gemiidat. " perenna hybrida, p. in idonine	inge erich in inteller	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		erit ma bie
" bypridus tigrinoides, m. p. practivoid genigeru, g. " " bypridus tigrinoides, m. p. practivoid genigeru, g. " " aber mit boppeften 34. " quinquevulnerus maximus, m. p. flatfi. Lifdon, 38ar " Mirabilis jalappa, m. wohitrichene Suntherofune, gemijd Myosotis alpestris fl. albo, z. weitbühlenbes Sergijmennid appear, m. wohitrichene Suntherofune, gemijd Agoria albe, t.e. tein weits febr ichone Stentis albe, z. z. baublih, Sergijmennidid a 276, 5 " " coereles, z. baublih, Sergijmennidid a 276, 5 " " coereles, z. baublih, Sergijmennidid a 276, 5 " " coereles z. baublih, Sergijmennidid a 276, 5 " " coereles z. befieber Suntendel zichespina a 276, 2 " " coereles ina, ich johne bimmelok zichespina a 276, 2 " " coereles ina, ich johne bimmelok zichespina a 276, 2 " " coereles ina, ich johne simmelok zichespina a 276, 2 " " sentende amaseona, Sungire im Gehiten. " ana fl. pl., stete nicht, gd. a 226, 5 " " hispanica purpurea, sentender albeit, gd. " somniferum d. pl., gd. Randiferte. " Somniferum d. pl., gd. Randiferte. " somniferum d. pl., jchon gd. Garten Blein, gd. " paeconiforum fl. pl., gd. ponenchildi. Mehn, g. " penstemon Hartwegi, m.p. in biserien Sorten geniidat. Perilla nankienasis, m. präntige ichwaspisame Siattyli Petunia hybrida, m. Setunien i. b. bejten griimranb., gdab gefferieten, weigliefigien Sorten gemiidat. " Gonnens and sorten gemiidat. " Gonnens and sorten gemiidat. " Babellina, gdf. gibe a " perenna hybrida, p. in idonine Sorten gemiidat. Perenna hybrida, p. in idonine Sorten gemiidat. " perenna hybrida, p. in idonine Sorten gemiidat. " perenna hybrida, p. in idonine	inge erich in inteller	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		erit ma bie
" oupreus, m.p. neue icharlachrothe Gautterbunne; " hybridus tigrinoides, m.p. prachivol genigeru, g. " aber mit doppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. Myosotis alpestris fl. albo, z. meißbifilenbes Sergifinnenni " fl. coerulea, z. Lanulifil. Sergifinnennich a 27m. 5. " azorica alba, t.e. ten weiße febr ichene Stendis " coelestira, ichi ichion ichiunchlane " Nemophila, in ben beiten Serten genhicht. a 27m. 5. " insignis, e. beitebr finnuelol kiebeshatu a 17m. 4. " cramboides alto coustat, e. neu. b. White falw mit weißer Umfännung, b. Rarb. Bezuf, rew Miootiana maeronbylist gigartes, m. eine Zabadoren unt beiten. 3' lang. Stattern, majetat. Stattpfel. Nigella damascena, Sungier im Gerhuen. " nana fl. pl., neue niebt. gcl. a 27m. 5. " hispanica purpurea purpurreolpe. Nyctarine capensis, m. wohiviedenbe, berbreitet Borgens Stenbs einen löglicher Stadiftere. Papaver bracteatum, p. idparlacytofter Wohn, gc paeonidorum fl. pl., gcl. pomenblith, Wohn, g Penstemon Hartwegi, m.p. in biserien Sorten gemidet. Perilla nanklenensie, m. brächtige ichwaerphanne Stattuff Petunia hybrida, m. Sennien i. b. bejen geführende, gen " flandestone, variablis, fchierer Isabellina, gcf. perinten ib. bejen geführende, gen " perenna hybrida, p. in dipatien Sorten gemidet. Polvlace grandilfora, m. in teles fasten gemidet. Polvgonum orientale pumilum, nieck. crientalither sinch vielen Spacken gemidet. Porlula achinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet.	iet.	1 2 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1	- 66666666666666666666666666666666666	erit man bie
" oupreus, m.p. neue icharlachrothe Gautterbunne; " hybridus tigrinoides, m.p. prachivol genigeru, g. " aber mit doppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. Myosotis alpestris fl. albo, z. meißbifilenbes Sergifinnenni " fl. coerulea, z. Lanulifil. Sergifinnennich a 27m. 5. " azorica alba, t.e. ten weiße febr ichene Stendis " coelestira, ichi ichion ichiunchlane " Nemophila, in ben beiten Serten genhicht. a 27m. 5. " insignis, e. beitebr finnuelol kiebeshatu a 17m. 4. " cramboides alto coustat, e. neu. b. White falw mit weißer Umfännung, b. Rarb. Bezuf, rew Miootiana maeronbylist gigartes, m. eine Zabadoren unt beiten. 3' lang. Stattern, majetat. Stattpfel. Nigella damascena, Sungier im Gerhuen. " nana fl. pl., neue niebt. gcl. a 27m. 5. " hispanica purpurea purpurreolpe. Nyctarine capensis, m. wohiviedenbe, berbreitet Borgens Stenbs einen löglicher Stadiftere. Papaver bracteatum, p. idparlacytofter Wohn, gc paeonidorum fl. pl., gcl. pomenblith, Wohn, g Penstemon Hartwegi, m.p. in biserien Sorten gemidet. Perilla nanklenensie, m. brächtige ichwaerphanne Stattuff Petunia hybrida, m. Sennien i. b. bejen geführende, gen " flandestone, variablis, fchierer Isabellina, gcf. perinten ib. bejen geführende, gen " perenna hybrida, p. in dipatien Sorten gemidet. Polvlace grandilfora, m. in teles fasten gemidet. Polvgonum orientale pumilum, nieck. crientalither sinch vielen Spacken gemidet. Porlula achinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet.	iet.	1 2 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1		erit 91 a bie 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
" oupreus, m.p. neue icharlachrothe Gautterbunne; " hybridus tigrinoides, m.p. prachivol genigeru, g. " aber mit doppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. Myosotis alpestris fl. albo, z. meißbifilenbes Sergifinnenni " fl. coerulea, z. Lanulifil. Sergifinnennich a 27m. 5. " azorica alba, t.e. ten weiße febr ichene Stendis " coelestira, ichi ichion ichiunchlane " Nemophila, in ben beiten Serten genhicht. a 27m. 5. " insignis, e. beitebr finnuelol kiebeshatu a 17m. 4. " cramboides alto coustat, e. neu. b. White falw mit weißer Umfännung, b. Rarb. Bezuf, rew Miootiana maeronbylist gigartes, m. eine Zabadoren unt beiten. 3' lang. Stattern, majetat. Stattpfel. Nigella damascena, Sungier im Gerhuen. " nana fl. pl., neue niebt. gcl. a 27m. 5. " hispanica purpurea purpurreolpe. Nyctarine capensis, m. wohiviedenbe, berbreitet Borgens Stenbs einen löglicher Stadiftere. Papaver bracteatum, p. idparlacytofter Wohn, gc paeonidorum fl. pl., gcl. pomenblith, Wohn, g Penstemon Hartwegi, m.p. in biserien Sorten gemidet. Perilla nanklenensie, m. brächtige ichwaerphanne Stattuff Petunia hybrida, m. Sennien i. b. bejen geführende, gen " flandestone, variablis, fchierer Isabellina, gcf. perinten ib. bejen geführende, gen " perenna hybrida, p. in dipatien Sorten gemidet. Polvlace grandilfora, m. in teles fasten gemidet. Polvgonum orientale pumilum, nieck. crientalither sinch vielen Spacken gemidet. Porlula achinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet.	iet.	1 2 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1	- 6666666	erft 91a bie 1. Mi 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 56.
" oupreus, m.p. neue icharlachrothe Gautterbunne; " hybridus tigrinoides, m.p. prachivol genigeru, g. " aber mit doppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. Myosotis alpestris fl. albo, z. meißbifilenbes Sergifinnenni " fl. coerulea, z. Lanulifil. Sergifinnennich a 27m. 5. " azorica alba, t.e. ten weiße febr ichene Stendis " coelestira, ichi ichion ichiunchlane " Nemophila, in ben beiten Serten genhicht. a 27m. 5. " insignis, e. beitebr finnuelol kiebeshatu a 17m. 4. " cramboides alto coustat, e. neu. b. White falw mit weißer Umfännung, b. Rarb. Bezuf, rew Miootiana maeronbylist gigartes, m. eine Zabadoren unt beiten. 3' lang. Stattern, majetat. Stattpfel. Nigella damascena, Sungier im Gerhuen. " nana fl. pl., neue niebt. gcl. a 27m. 5. " hispanica purpurea purpurreolpe. Nyctarine capensis, m. wohiviedenbe, berbreitet Borgens Stenbs einen löglicher Stadiftere. Papaver bracteatum, p. idparlacytofter Wohn, gc paeonidorum fl. pl., gcl. pomenblith, Wohn, g Penstemon Hartwegi, m.p. in biserien Sorten gemidet. Perilla nanklenensie, m. brächtige ichwaerphanne Stattuff Petunia hybrida, m. Sennien i. b. bejen geführende, gen " flandestone, variablis, fchierer Isabellina, gcf. perinten ib. bejen geführende, gen " perenna hybrida, p. in dipatien Sorten gemidet. Polvlace grandilfora, m. in teles fasten gemidet. Polvgonum orientale pumilum, nieck. crientalither sinch vielen Spacken gemidet. Porlula achinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet.	iet.	1 2 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1		erit 91a bie 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.
" oupreus, m.p. neue icharlachrothe Gautterbunne; " hybridus tigrinoides, m.p. prachivol genigeru, g. " aber mit doppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. Myosotis alpestris fl. albo, z. meißbifilenbes Sergifinnenni " fl. coerulea, z. Lanulifil. Sergifinnennich a 27m. 5. " azorica alba, t.e. ten weiße febr ichene Stendis " coelestira, ichi ichion ichiunchlane " Nemophila, in ben beiten Serten genhicht. a 27m. 5. " insignis, e. beitebr finnuelol kiebeshatu a 17m. 4. " cramboides alto coustat, e. neu. b. White falw mit weißer Umfännung, b. Rarb. Bezuf, rew Miootiana maeronbylist gigartes, m. eine Zabadoren unt beiten. 3' lang. Stattern, majetat. Stattpfel. Nigella damascena, Sungier im Gerhuen. " nana fl. pl., neue niebt. gcl. a 27m. 5. " hispanica purpurea purpurreolpe. Nyctarine capensis, m. wohiviedenbe, berbreitet Borgens Stenbs einen löglicher Stadiftere. Papaver bracteatum, p. idparlacytofter Wohn, gc paeonidorum fl. pl., gcl. pomenblith, Wohn, g Penstemon Hartwegi, m.p. in biserien Sorten gemidet. Perilla nanklenensie, m. brächtige ichwaerphanne Stattuff Petunia hybrida, m. Sennien i. b. bejen geführende, gen " flandestone, variablis, fchierer Isabellina, gcf. perinten ib. bejen geführende, gen " perenna hybrida, p. in dipatien Sorten gemidet. Polvlace grandilfora, m. in teles fasten gemidet. Polvgonum orientale pumilum, nieck. crientalither sinch vielen Spacken gemidet. Porlula achinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet.	iet.	1 2 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1		erst star star star star star star star s
" oupreus, m.p. neue icharlachrothe Gautterbunne; " hybridus tigrinoides, m.p. prachivol genigeru, g. " aber mit doppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. Myosotis alpestris fl. albo, z. meißbifilenbes Sergifinnenni " fl. coerulea, z. Lanulifil. Sergifinnennich a 27m. 5. " azorica alba, t.e. ten weiße febr ichene Stendis " coelestira, ichi ichion ichiunchlane " Nemophila, in ben beiten Serten genhicht. a 27m. 5. " insignis, e. beitebr finnuelol kiebeshatu a 17m. 4. " cramboides alto coustat, e. neu. b. White falw mit weißer Umfännung, b. Rarb. Bezuf, rew Miootiana maeronbylist gigartes, m. eine Zabadoren unt beiten. 3' lang. Stattern, majetat. Stattpfel. Nigella damascena, Sungier im Gerhuen. " nana fl. pl., neue niebt. gcl. a 27m. 5. " hispanica purpurea purpurreolpe. Nyctarine capensis, m. wohiviedenbe, berbreitet Borgens Stenbs einen löglicher Stadiftere. Papaver bracteatum, p. idparlacytofter Wohn, gc paeonidorum fl. pl., gcl. pomenblith, Wohn, g Penstemon Hartwegi, m.p. in biserien Sorten gemidet. Perilla nanklenensie, m. brächtige ichwaerphanne Stattuff Petunia hybrida, m. Sennien i. b. bejen geführende, gen " flandestone, variablis, fchierer Isabellina, gcf. perinten ib. bejen geführende, gen " perenna hybrida, p. in dipatien Sorten gemidet. Polvlace grandilfora, m. in teles fasten gemidet. Polvgonum orientale pumilum, nieck. crientalither sinch vielen Spacken gemidet. Porlula achinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet.	iet.	1 2 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1	1 66666666	erst star star star star star star star s
" oupreus, m.p. neue icharlachrothe Gautterbunne; " hybridus tigrinoides, m.p. prachivol genigeru, g. " aber mit doppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. Myosotis alpestris fl. albo, z. meißbifilenbes Sergifinnenni " fl. coerulea, z. Lanulifil. Sergifinnennich a 27m. 5. " azorica alba, t.e. ten weiße febr ichene Stendis " coelestira, ichi ichion ichiunchlane " Nemophila, in ben beiten Serten genhicht. a 27m. 5. " insignis, e. beitebr finnuelol kiebeshatu a 17m. 4. " cramboides alto coustat, e. neu. b. White falw mit weißer Umfännung, b. Rarb. Bezuf, rew Miootiana maeronbylist gigartes, m. eine Zabadoren unt beiten. 3' lang. Stattern, majetat. Stattpfel. Nigella damascena, Sungier im Gerhuen. " nana fl. pl., neue niebt. gcl. a 27m. 5. " hispanica purpurea purpurreolpe. Nyctarine capensis, m. wohiviedenbe, berbreitet Borgens Stenbs einen löglicher Stadiftere. Papaver bracteatum, p. idparlacytofter Wohn, gc paeonidorum fl. pl., gcl. pomenblith, Wohn, g Penstemon Hartwegi, m.p. in biserien Sorten gemidet. Perilla nanklenensie, m. brächtige ichwaerphanne Stattuff Petunia hybrida, m. Sennien i. b. bejen geführende, gen " flandestone, variablis, fchierer Isabellina, gcf. perinten ib. bejen geführende, gen " perenna hybrida, p. in dipatien Sorten gemidet. Polvlace grandilfora, m. in teles fasten gemidet. Polvgonum orientale pumilum, nieck. crientalither sinch vielen Spacken gemidet. Porlula achinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet.	intelligence of the control of the c	1 2 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1		erst ma bie
" oupreus, m.p. neue icharlachrothe Gautterbunne; " hybridus tigrinoides, m.p. prachivol genigeru, g. " aber mit doppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. Myosotis alpestris fl. albo, z. meißbifilenbes Sergifinnenni " fl. coerulea, z. Lanulifil. Sergifinnennich a 27m. 5. " azorica alba, t.e. ten weiße febr ichene Stendis " coelestira, ichi ichion ichiunchlane " Nemophila, in ben beiten Serten genhicht. a 27m. 5. " insignis, e. beitebr finnuelol kiebeshatu a 17m. 4. " cramboides alto coustat, e. neu. b. White falw mit weißer Umfännung, b. Rarb. Bezuf, rew Miootiana maeronbylist gigartes, m. eine Zabadoren unt beiten. 3' lang. Stattern, majetat. Stattpfel. Nigella damascena, Sungier im Gerhuen. " nana fl. pl., neue niebt. gcl. a 27m. 5. " hispanica purpurea purpurreolpe. Nyctarine capensis, m. wohiviedenbe, berbreitet Borgens Stenbs einen löglicher Stadiftere. Papaver bracteatum, p. idparlacytofter Wohn, gc paeonidorum fl. pl., gcl. pomenblith, Wohn, g Penstemon Hartwegi, m.p. in biserien Sorten gemidet. Perilla nanklenensie, m. brächtige ichwaerphanne Stattuff Petunia hybrida, m. Sennien i. b. bejen geführende, gen " flandestone, variablis, fchierer Isabellina, gcf. perinten ib. bejen geführende, gen " perenna hybrida, p. in dipatien Sorten gemidet. Polvlace grandilfora, m. in teles fasten gemidet. Polvgonum orientale pumilum, nieck. crientalither sinch vielen Spacken gemidet. Porlula achinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet.	intelligence of the control of the c	1 2 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1		erst star star star star star star star s
" bypridus tigrinoides, mp. practivoid genigerus, g. fl. pl., neu, wie vorificie, aber mit boppeften 34. " guinquevilnerus maximus, mp. flatifi. itidou. Sar Mirabilis jalappa, m. wohitrichene Sunderfolmer, genijd Myosotis alpestris fl. albo, z. weißbilhenes Sergijmennid z. Goerelea, z. Uaudiliß, Sergijmennidid a 276.5 " azorica alba, t.e. ten weiße febr ichene Sergijmennid z. Zergijmennid z. Zer	innel gem.	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		erst ma bie
" bypridus tigrinoides, mp. practivoid genigerus, g. fl. pl., neu, wie vorificie, aber mit boppeften 34. " guinquevilnerus maximus, mp. flatifi. itidou. Sar Mirabilis jalappa, m. wohitrichene Sunderfolmer, genijd Myosotis alpestris fl. albo, z. weißbilhenes Sergijmennid z. Goerelea, z. Uaudiliß, Sergijmennidid a 276.5 " azorica alba, t.e. ten weiße febr ichene Sergijmennid z. Zergijmennid z. Zer	innel gem.	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		98a 44.
" oupreus, m.p. neue icharlachrothe Gautterbunne; " hybridus tigrinoides, m.p. prachivol genigeru, g. " aber mit doppelen 31. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. " quinquevulnerus maximus, m.p. flaifil. ichion. 32m. Myosotis alpestris fl. albo, z. meißbifilenbes Sergifinnenni " fl. coerulea, z. Lanulifil. Sergifinnennich a 27m. 5. " azorica alba, t.e. ten weiße febr ichene Stendis " coelestira, ichi ichion ichiunchlane " Nemophila, in ben beiten Serten genhicht. a 27m. 5. " insignis, e. beitebr finnuelol kiebeshatu a 17m. 4. " cramboides alto coustat, e. neu. b. White falw mit weißer Umfännung, b. Rarb. Bezuf, rew Miootiana maeronbylist gigartes, m. eine Zabadoren unt beiten. 3' lang. Stattern, majetat. Stattpfel. Nigella damascena, Sungier im Gerhuen. " nana fl. pl., neue niebt. gcl. a 27m. 5. " hispanica purpurea purpurreolpe. Nyctarine capensis, m. wohiviedenbe, berbreitet Borgens Stenbs einen löglicher Stadiftere. Papaver bracteatum, p. idparlacytofter Wohn, gc paeonidorum fl. pl., gcl. pomenblith, Wohn, g Penstemon Hartwegi, m.p. in biserien Sorten gemidet. Perilla nanklenensie, m. brächtige ichwaerphanne Stattuff Petunia hybrida, m. Sennien i. b. bejen geführende, gen " flandestone, variablis, fchierer Isabellina, gcf. perinten ib. bejen geführende, gen " perenna hybrida, p. in dipatien Sorten gemidet. Polvlace grandilfora, m. in teles fasten gemidet. Polvgonum orientale pumilum, nieck. crientalither sinch vielen Spacken gemidet. Porlula achinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet. Primula chinense flandriata aloa, m.t. weifigefrante Sorty pravate gemidet.	innel gem.	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		erst ma die Ma die Ma die Ma die Ma die

	à Prise. gr. pfg.		à Prise. gr. pfg.
Schyzanthus grandisorus oculatus, sönne Schyzanthus retusus, m.p. Hoders praduu sidarladu. Zchyzanthus sendin Gordinam. M. L. Sendin Gerbung, sendin sidarladu. Zchyzanthus sendin Gerpans s. p. lin. Krustrant in victor Parbu gem. " nana fl. pl., nene Bucg. i. vici. Harber gem. " nana fl. pl., nene Bucg. i. vici. Harber gem. Sciaffa, p. prädisig tosenrosis Sitem, osca gracca (pendulu), hang, tosip Sitem, a M. Serby sendin singulata, s.m. Dangurt zu, indent. Bestleib. vonsigl. Solanum Melongena, m.t. Girersfanse, verigiteene gemistig. Statice Bondweili, m. gelbe Lattice. Idon Grebistor sinuata, m. Usur. " sinuata, m. Usur. " hybrida, m. verigiteenstartigs militäde Bonquets Statice Bondweili, m. gelbe Lattice. Idon sir inversioner in hybrida, m. verigiteenstartigs militäde Bonquets. Strip Dennata, p. besanutes Reverguas. Thousant, m. verigiteenstartigs menata, p. besanutes Reverguas. Trapetees creata lutea fl. pl., m. große gelbe gel, Etnheutenslinner großenstalta, s.m. tradisligante. Bondweispelbe gelpenstartig. Thunbergia alata, s.m. tradisligante. Pl. m. große gelbe gel, Etnheutenslinner " n. sulpharea fl. pl. m. studerisliges " ranuncolidos striata fl. pl., m. armungsfreiste Tropseolum majus, große pam. Rerie, gen. a. 276. 2 Sex. " nanum atrocaccineum, bisigart. Santagus, m. singulatus p. großenstalta, neu, mit bunker har, m. großenstalta, neu, mit bunker har, m. " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 - 1 - 1 - 2 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Agrostis nebulosa, m. } beide feit feit u. zierf. für Benquets pulchell., m. } pulchell., m. } beide feit feit u. zierf. für Benquets Anthoxenthane greche, m. öfflösse Rudgras. Anthoxenthane greche, m. öfflösse Rudgras. Avena sterilis, feit intereflunte Saferari Briza maxima, grejes Zittergras "minor, fleines Browus brizaelora is, fehr fidöne Zittergras abnitiste Ercepe Cer-toechtoa pendul. 2º johes, fehr fidön für Benquets. Brigostis b-hiensis, nutte Zittenlögras. "eleg ns, siertides "namaquensis, orrildan, "senegellensis, vom Erungall, fidön Gymerium arzenteum, p. befaunte Fradarbi, a. Edd. 5 Egr Hordeum jubstum, p. roffifides Gras, fehr fidön. Isolepis gracilis, p.t. jetrifides Gras fihr fidmid. Lagurus ovatus, rijominges ziterlides Zemuntgras Bennissetum longistilua, fidmes Berjengtras Stips filledulais p. indenforminge, ben Gynerium argenteum im steinen ich fährlich. Hänger a. Edd. 5 de. "pennasa p. blößbes Kecergras, Affangiene Edd. 5 de. "pennasa p. blößbes Kecergras, Affangiene Edd. 5 de. "pennasa p. blößbes Kecergras, Affangiene Edd. 5 de.	2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 1 6 - 6 -
GEOI	R	GINEN.	

Bon dieser dantharen Blume enlitibire ich 400 Sorien und enthält mein Sorimen mur Borzügliches, da ich alljährlich die gerühmtesten antschafte und die minder guten aussicheibe. Daß mein Soriment den Anserdaumgen der Rettzeit enthricht, gehr wohl ganigend is hervor, daß meinen Gorginen im vorigen Jahre von der Jury der internationalen Gartendau-Ausstellung zu Kamburg zwei erne Weddaillen zuerfaum vonron. Enthalte nich daher ieder weiteren Anpreisung.

GLADIOLUS.

Gladiolus gandavensis.

Bon meinem vorzüglichen Sortiment erlaffe ich nach meiner Bahl in blabbaren Zwiebeln (ohne weiteren Rabatt)

12 Stüd in 12 Sorten mit Vamen für 1, 2, 8 und 4 1 25 Stüd in 25 Sorten mit Namen für 2½, 4, 6 und 8 Ac. 50 Stüd in 25 Sorten mit Namen für 2½, 4, 6 und 8 Ac. 3m Rommel ohne Namen (meistens roche) 12 Stüd 10 1/2, 100 Stüd 2 Ic. 15 1/2.

Neber Georginen und Glaciolen ift ein besonderes beschreibendes Bergeichniß erschienen, welches anf franco Berlangen bereitwilligst franco gugesandt wird.

Blumistische Meuheiten.

crbenen. Kolgende ganz neue, vorzügliche Sorten find ten Mal in den Handel gegeben.
Aah Mahl bes Bestellers a Std. 10 Sgr., a Dhd. 3 Thr. 18 Sorten 3 Thr.

28 Sorten 3 Tylr.

28. Adame Momir Secfor, weiß mit zart lamenbelblau eingefigit, große Blume, reichbliß, robujter Buche, reizhwelse große Blume, reichbliß, robujter Buche, reizhwelse Pucheti. Daaron von Zenkhofts, febj. digardachunderreith m. weißem Ange, große Minge, febj. digardachunderreith m. weißem Ange, große Blume, Beuheit ertoa.

28. Angen don Gene hier große Minge, großen Minge, robufter Buchs, ertoa.

28. augund von Gen hier gewes Ange, großelmig, robufter Buchs, ertoa.

28. augund von Gen hier Gewes Ange, großelmig, robufter Buchs, ertoa.

28. augund von Gen hier Buche gewöhltung, robufter Buchs, ertop ein Buche, ertob Gen ein der hier gewes der gewestelle gewestelle gewestelle gewestelle gewestelle Buchs, ertop ein der Gen ein gewestelle Buche, ertoges weißes Augund der Gen ein großen weißen Ange, großer weiße Augund, bei reichbliße, robufter Buchs, ertoa.

28. augund gewestelle gewestel

Franckin Amelie Stitel, billadenskeldan mit großent weigen Auge, ertea.

Franckin Vanfine Schwaß, blivolett, nach d. Mitte etwas dunft, groß, weiß, Ange, febr großfölfigt, n. v. febr rob. Wachie, Neuh. ert.
James Beilan & Sons, dunfelevinthroth mit rubinvolett, Ange weiß, Neuheit, erte.

Joan Francer, blendeud feurigifgarlachroth mit weißem Ange, icht großfölfigend, neue Kardnug, robuster Buchs, ert.

Jefaletta zunifs von ein dahaf, zimwoberrofa, gegen d. Mitte etwas dunffer, mit weißem Ange, errea.

Radame Zifförer ('therierion), tein weiß, wohl ichon eine vorjährige Renheit, ader d. vorziglichiffe aller weißem Berebenen.

verjährige Venigett, aber d. vorzigitusfie aller weigen Serbeitel.

**Maliett linter fännttlichen Flordinnen nehmen d. Fuchfien
vie im freien Lande erfägeinen die Blumen in großer Menge. Kofgeliede Sorten find d. vorzigialfehften glächungen d. 3. 1898. 1869.

(E. heißt Corolle, B. Betalen, S. Senalen, R. Kelch.

Folgende 6 Sorten a Sick. 10 Sgr., alle 6 für 1 Thir. 15 Sgr.

3. Albert Geene (Coene). E. dieier Kuchste il unfallend breit,
den für den konnen und Kolorin, S. jehr breit, hellrech und
onne unwähledeboart.

Beante de Gendbrugge (C.). C. fehr groß, breit, ftart gefallt,

regelmäß. Ban b. K., blan m. amaranthrothem Schimmer, S. iche breit, iharlachroth, welche ganz anirecht i. b. Höhe sichen.

83. Benisolia von eilene (Lewone). Benisolia von einersphylls mit eben solcher Schaub. Benisolia von einersphylls mit eben solcher Schaub. Benne aber schwalz größer, mit sart gesüllere biblaner C., S. n. R. glänzend denntelroth, Phange vord mur 13- 16 30 sle hab.

84. Franceis Deitos (C.). E. groß sigon geformt dräumlich Ukroshmit helfrother Bass und giedigerdigen berieter Ereise, S. carmiuroth, lang, vollig zursägledsper

85. Bil. Fillian (Crousser). S. lebhaft carmiuroth, groß und gut zursägledspen, C. mit vielen duntelpurpurvioletten carmiuroty gestresten B., sehr blumenreiche Zwegesere.

1. hönomenen (Lewo) C. m. groß langen Blumenbfättern, hell-carmiurola m. lachsfarb. Bass, S. lang, roß m. grill. Spit. Blumgeschriften, bell-carmiurola m. lachsfarb. Bass, S. lang, roß m. grill. Spit. Blumgeschriften, b. Besellers 2. Thir. 20-Ggr. a Std. 71/2 Sgr.

12. Sorten n. Bass b. Besellers 2. Thir. 20-Ggr. a Std. 71/2 Sgr.

101. Lamoricière (Corn.), Blume v. tadellosen Bau, B. zweisappig, festivoset und jedes mit einem dreiten lestrose Bande geziert, E. dunsterose, sam wid degenfronnig zweisgelegt.
102. A. Astermans (Corn.). C. v. valgereiden. Bau, selh, carminroth mit dunstessen gestert, E. zweisgelegt. Van deutsche Bau, selh, carminroth mit dunstessen Solori als d. E. Blume v. höhertend. Dimensionen. 103. Bad. A. Bertschaftest (Corn.). Elegante Barietät. E. gut gefüllt, schrole mit selhgit carminrothen Abern, Blumenblätter zweisappig. E. horizontal tiegend.
104. Saltimbanque (Lem.). selh weite gefüllte E. ams 10—13 B. desteh, trightosia m. turzem hessenwirten S. E. dert, carmin, zweisspegen.

Rene gefülltbl. Scarlet-Pelargon.

Diese neuen Zuchtungen können gar nicht genng empschsen werben, benn sowohl zur Eufenr "Topfen für Zimmer, Salons ze. wie auch für bas freie Land sind sie gleich werthvoll.

Folgende 12 Sorten erlaffe ich für 3 Thir. à Sid. 10 Sgr. 6 Sorten nach meiner Bahl für 1 Thir. 20 Sgr.

51. Conseiser Angon (Rendatler). Blume iehr groß, falt fügelrund, hochroth mit orange Schimmer.
52. Zeanne de St. Maur (Kend.). Bl. jehr größ v. blend. eimoberr.
53. In. de St. Jean (Crusse), bliroin nu carmin n. lachöfard. schut.

54. Madame Wondet (Allegatière). glänz, lisaroja, vielblum. Jwerf.
55. " Nachodiet (Nend.). Bl. groß, artroja m. weißi. Schimm.
56. Marie Cronffe (Cr.). hellitaroja m. weißi. Schimm.
57. "Etladet (Tomkus). fint geinlt, sart rojarbig.
58. "Enwine (Lew.). die Awergiorte tooller Bouquets von hönen gartroja Mimen, abnich wah. Lemoine.
59. Tem Vouce Gerlie (Nend.). Jwergiorte, leicht fürsöre, jöhöne Bar.
60. Trompfe, buntelfodarda, freifig wachjenb.
61. Wielfgart, jönn feine Bl. bringen 2—3 große Blumendoben.
62. M. beltsjärt, jönn feine Bl. bringen 2—3 große Blumendoben.
63. Beltsjärt, jönn feine Bl. bringen 2—3 große Blumendoben.
64. Machiel et der Gerlieben wie der Gerlieben der Gerlieben gerichten von ganz
65. Beltsjärt, jönn feine Bl. bringen 2—3 große Blumendoben.
66. Ertompfe, bungen 25. Beltsjärte von ganz
66. Ertompfe, bungen 25. Beltsjärte von ganz
66. Ertompfe, geriglicher Boltsmunchen.
66. Beltsjärte, genn, belbsia mit weiß gestemt und gestammt.
66. Beltsjärte, genn, belbsia mit weiß gestemt und gestammt.
67. Bachen, jetzen
67. Sinderen, jetzen gestammt m. dipoärzi. Wenn, jetzen
67. Sinderen, jetzen im Gerlieben der Soren, jetzen
67. Sinderen, jetzen im Gerlieben der Soren, jetzen
67. Sinderen, jetzen im Gerlieben der Soren, jetzen
67. Radiptehwe 6 Soren im Fren Wal im Sandel.
68. Radiptehwe 6 Soren im Fren Wal im Sandel.
68. Radiptehwe 6 Soren im Fren Wal im Sandel.
69. Renz, carmin m. weiß. Stern ob. weiß. Klammen in brillanten
69. Weier

Commerzienrath Breitenfeld, amaranth mit Sftreifigem Ster

sommerzieritals sereienies, unartung und Spietigen Ster prafficol in diefe zichgung. Sonts Göbel, hellblau rofa ni. weißem Stern, rofa überadert, ne in Zeichung, wahrhopt ichön. Vanf Buttnert, hellblau, dunkelblau überadert mit weißem Nand Schlund schwarz gehöhlunig. Nath Senthke, immitg tief purpur m. ichwarz überadert n. geneh eine der huntelken.

Rath Senishe, samming tief purpur m. schwarz überadert n. geneg eine der dunkelsen.

Stiffelm Stinkfer, weißer Stern, carminroth umfaßt n. am Mant gestammt, große sehr leddagte Almme.

Coleus, 1869er Renheit, mit gestem Blattrande.

Beschen Berth die bertichen Blattvlanzen zu Gruppirungen haben in wohl hindinglich befaunt.

14. Albert Victor, 15. Baroness Rothschild, 16. Duke of Edingburgh, 17. Empress, 18. Masterpiece, 19. Model, 20. Prince Leopold, 21. Prinzess Beatrice, 22. Prinzess Louise, 23. Quen Victoria, 24. Refulgens, 25. Umpire.

Borstebende 12 Sorten lieter ab 1. April sitt 1 Tht., 15 Sgr., ab 1. Mai für 1 Tht. 5 Sgr., einseln a Sich 5 Sgr.

Coleus, 1868er Renheiten.

Batemani, 2. Bausei, 3. Berkeleyi, 4. Carkei, 5. Dixii, 6. Marschalli, 7. Murrayl, 8. Reveesi, 9. Ruckeri, 10. Saurndernsii, 11. Scott. 12. Willsoni, 13. Telford (auren).

Baritchende 12 Sorten liefere ab 1. April sitt 1 Tht. 10 Sgr., ab 1. Mai für 1 Tht. — einzeln a Stild 5 Sgr.

53. 3A. de St. Jean (Crusse), dilroja m. carmin n. lachsf	arb. scho	att.	Farbentonen, reichblithend auf niedrigem Strauch.			1
Obit= und Alleebanme.	gr.—thir	. gr.	Waion	grt	hir. gr.	III.
Aepfel und Birnen in verschiedenen guten Sorten a Std.	71/	15	950 644	- 1		
Rividen, süße " " " " " "	10 -	15	hochstänunige Kronenbaume in ichonen bautbar blubenben neuen und vorzuglichen alteren Sorten.			1
,, idiwarzjaure	71/2 -	10	Thea. Remontant, Bourbon, Noisett, 11/2-6' hoch, 12 Std.			
Bflaumen in verschiedenen guten Sorten , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	6 - 71/2 -		3—9 thir a Std. [1	10	1-	
Spalierbaume von Aepfel, Birnen, Ririchen, Bflau-	1/2		Burzelächte Thea, Bourbon, Noisett, Remontant, Bengalensis, m. Mam, i. 70 Sort, 12 Std. 11/2-2 thir, a Std.	5 -	- 10	
men in herichiedenen Chräben	71/2 1		Souvenir de la Malmaison, befannte Brachtroje, 25 Std.			
Lealinupe, jehr starte 50 Std. 30 Ehr. " "		5 20	3 thir. 10 fgr a Std.	5 -	- 10	0
Rajianien (Asculushypocastanum) 25 31/2	4 -	10	Burzelachte Centifolien, Damascener, Gallica, Bouquet-	5 -	$-71/_{2}$	F
Linden, gribl. (Tilia plaiyphylla) 100 " 60 " " "	20 1		u. Spbriden, 25 Gorten m. Ramen 4 thir., 12 Gort. -		2-	1
Augelatazten, (Robinia inermis) 12 , 8 , " "	20 1	-	Monaterojen, Rosapallida. 100 Std. 6thir. 12 Std. 1thir. a Std. 2	21/2 -	- 5	1
Fruchtsträucher.			Schlingpflanzen.		93	1
Simbeeren, zweimal tragende: "Belle de Fontenay			Aristolochia Sipho. Pfeifenstrauch, schnellwuchfig, m. fehr			
"Belle de Fontenay a Std. 21/2 Sgr. a Dtd.	25 -	- 1	groß. Blätt., ftarke Pflanzen a Dyd. 4-5 Rg. a Std.	10 -	-15	
" große rothe il. geibe houanotigie 100 Sta.	75 -	-	Bignonia radicanus (Tecoma) " "	10 -		1
Johannisberen, weiße, hellrothe, bilrothe a Dy. 10fgr. 100 ,, Ctachelberen, i. verichied. gut. Corten	60 -	_		10 -		1
" " " " hochstämmige a Dto.	18 -	_	" bybrida fulgens. Blume groß, jammtigcarmoifing. "	10		1
" englische sehr großfrüchtige:			" languinosa candida. Blume groß, weiß, idion "	10 -		-
Beauty of England, Incomparable, roth Justicia, Lord Douglas, gclb	30 _		Hedera, t. vericheb. grin- u. buntblatt. Cort. u. verich. Oron. I	21/2 -	- 10	
Green walnut, Melbourne hero, grün	00		Glycine sinensis a Std.	15 -		
Erdbeeren, nene fehr groffrüchtige.			Lonicera Pereclimenum fol. var " " Vitis quinque folia. milder Wein a Dyd. 24 Ggr. " "	$7\frac{1}{2}$ $2\frac{1}{2}$		i
Annanas perpetuel. trägt b. gan, Sommer reicht. Fruicht, $1-11/2^{n'}$ lang u. 1" breit, Fleitich weiß ob. weißichtopia, Irista, iffig. 1. ette gewürzeich The Great Airiculturist. Fruicht fehr groß, Reicht wach 180 feitie, de areneicht gewißes Modelman.			" Veitchei, neuefte empfehlenswerthe Barietat d.	- 12		
Frucht, 1-11/2" lang u. 1" breit, Fleisch weiß			wild, Beines, Blätter braumroth metallartia	-1/		
The Great Atriculturist, Frucht jehr groß, Fleich			fdimmernd, sehr samellwiidssig	74/2		
totil, felt, faitig, D. angeneight gerontal. Celamina	15 -		grin, Blatt, find bibid gelb gezeichn., pollftanb.			1
Boule d'or, Frucht groß v. rundl. Form u. glang. oranger. Fleifch schneeweiß, v. ausgez. Parfilm			hart rouft his 8' hach 12 Std. 24 4cm	21/2		1
Broelyn scarlet, neue Scharlach-Erdbeeren			Cobaea scandens " "	21/2	71/2	
Broclyn searlet, neue Scharlach-Erbbeeren Borstehende Sort. à Std. 2½ jgr., d. 4 Sort. à 1 Std. 6 jgr.			Callystegia dahurica 25 " 1 " " "	2	12	
	3/15	20	Callystegia daturica. 25 " 1 " " Pilognia suavis . 25 " 1½" . " Berjdjieb. [djnellwadjf. Schlingbfl. f. b. Somnier 3. Befl. v.	21/2		
Belle de Paris, Bicton Pine, La Constante, jede		20	Lauben, Band. u. A. 25 St. 1 Re. 10 La a Dy. 1 Re a Std.	21/0		
Dr. Nicaise, feir groß, lendjiend roth			Conferen und immergrine Pflanzen.	12		
				3	14-	No.
Scott, Cox hybrid, Wizard of the north, Pea and be bodigs Sedling, La Sultane, Cremond, Justicia. 5 jgr.				10	- 15	
Princess Alice, Duc de Malakoff acht		15	" " folis aureis marginata, die duntel-	15		
GuteSort.i. Rommelna Schot. 10fgr., nurd. vorzüglichft. a Schot.		15	grünen Blätter gelb gerandet	15		
Auf Berlangen d. Beichreibg. d. Gorten gerne zu Diensten.	-		" " hymalaica (foem). m. grünen Blättern " latimaculata, die grünen Blätter mit großen breiten gelben Streifen gesch.			
Tranerbäume.	fgr		großen breiten gelben Streifen gefch	10		
Eichen von 4-12 Fuß hoch a Std.	71/0-	-60	" " viridis, mit gang grünen Blättern ! Außer vorstehend, erhalte noch jum Frühjahr 12 vorzüg:	10		
Weiben, ichwarzbr. amerifan. veredelt, 6-10 fuß hoch ,, ,, Linden, großblattrige	15 - 15 -	-30	lichfte Neuheiten, b. ich i. gaufe b. Sommers abgeb. fann. Preis jowie Bejdreibg. b. Sort. theile bereitwill. mit.			
Linden, großblattrige " " Rosen, gefüllte weiße, 8—15 Fuß hoch " "	30-		fann. Preis jowie Bejdreibg. d. Sort, theile bereitwill, mit.			
Caragana arborescens pendula, impher 2 roller:	- 00	00	Alle Auguba find zu empfehlen und halten unfere Binter unter leichter Deckung aus.			
erbsenbaum gracilis pendula seinblatt zierl. Tranererb. " "	20- 15-		Buxus sempervirens arborescens, baumart. Burbaum a St.	10	3 -	
Frunus chaemacerasus pendula, lent gierliche hous	7		" angustifolia fol. arg. marg. " Calistris cupressoides, cupreffenförm. a Did. 11/2 Re. a "	10 5	_ 15	
gende myrthenblättrige Kirsche	15-	-25	anadrivatrie (Rigta articulate) hallitant hart fehr ichan			
baum m. gefiedert. bflgrun glangenden Blattern " "	25-	-40	3. Einjaff, immergr, Grupp, 25 Std. 2—4 R. a Std.	21/2	- 10	
Bierbäume und Straucher,	gr.—thl	ror	Cupressus Lavsoniana, schone Confere m. hangend.	5		
welche fammtlich empfehlenswerth.		1	Bweigen a Dyd. 1 15 15 15	71/2	- 15	
		-	Juniperus Lycia, phöniziicher Gabebaum a , , , , Sabina, Gabebaum Hochstämme mit Krouen , , , ,	25	1 15	
triloba (Amygdalobsis Lindley Pronus triloba).	5 -		ichwächere u. Pyramiden " "	71/0	- 25	
ein nicht genug zu empfehlender Strauch. Blumen frart gefüllt, zartroja und ericheinen			squamata (dumosa) liegender	61/0 -	- 20	
fie felbst bei kleinen Pflanzen i. großer Menge	10	15	" virginiana, fdjöne Pflangen bon 1-11/2' hod) " " Taxodium sempervirens (Sequoia), m. ausgebreit."	71/2	- 15	1 10
Calycanthus Horidus, Gewurzstraud)		-	prächtigen Aesten à Dist. 1 Be 20 to "	5	- 71/2	
Crataegus oxyacantha fl rubro pl., rother gefüllt blith.		10	Taxus cannadensis, Tarus oder Cibe , " Salisburnia adianthifolia (Ginyo biloba). m. fädjer-	71/2	5 -	13
Dorn	3	10	förm. dilgriin. i. Wint. abfall. Bl. a Dtd. 11/2 Re. " "		-	
neuer icharlachrother gefüllt bliib.,			Thuja, Lebensbaum, veridgiedene Gorten "		1-	
Deutzia gracilis, meifie Amerof., scabra meifie reicht a Stef	15 -	-	" aurea, mit goldig schimmernder Laubfärbung, schr schön, a Dyd. 2—10 R	5 .	_ 30	
" crenata il.plwg.dichtget.Bl.100St.5.BeaDt.1.Be	21/2 -	5 5	" compacta vera. gedrungener " "	5		1
" Fortunei, mit sehr groß, weiß. Biffichenrispen "	5 -	-	" filiformis, mit sadensorm, hängenden Zweigen " " " pyramidalis, pyramidensormiger " "	5	5 70	
ragus syrvauca purpurea, priminite griniphine	5 -	20	Thujopsis borealis. vorziiglich ale Ginzelpfl., d. ichone grünte			
Fraxinus exeisior erispa, Robleiche m. grünfohlart, Roll			Farbe m. felbft burd firenge Ralte men. verandert a Std.		- 20	
welche erst v. Froste gerstört wird. In hies. Gegend wenig verbreit. 2' h. Burgmidenhäume n Stof 15 in fachif				11/2	1 15	
Gleditschia triacanthos und inermis a Std. 15 jgr., hochit.	10 -		Siervon befige 2 extra ichone Exemplare von 7 u. 8' Sobe, welche feit 6 Jahren ohne jede Bedeckung bie			
	10	- 1	Winter überftanden, Preis nach Uebereinfunft.			
" prunifolia fret. coccinea u. fret. luteo, jede . " " Prunus cerasus fl. pl., weiße gefüllt blüh, stiriche " "	10 -		Außerdem noch verichiedene Coniferen und immergrline			1 8
Ribes atrosan., rothbl. Johannisbeer. 12 Std. 25 igr. "	1111	-5	Pflanzen zu billigsten Preisen.			
Pali i i i i i i i i i i i i i i i i i i	10 - 21/2 -					
hysnida rothhliih viscosahybrida maibhl iaba	21/2 - 20 J	1	Day Dag Catterna San Sterman Total			
nobinia inermis. Attigetatājie	21/ ₂ - 20 1 71/ ₂ -	5 5	ZurAusstattung der Blumengärten	19.4	00 1	
"hyspida, tothblith., viscosa hybrida. weißbl., jede """ Spiraea prunifola II pl weiße gefülltbl. Spirfiande "" Sydonia japonica. rothblithender Kanoleonsdorn	21/ ₂ - 1 20 1 71/ ₂ - 3 - 3	5	Zur Ausstattung der Zlumengärten empsehle ganz besonders nachstehnde		100 1 Std: Std:	
Abolina inermis. Rugatatajte	21/ ₂ - 20 1 71/ ₂ -	5 5		Stat. S		
nooma merms, xugatatate 12 " 8 " " " hyspida, trutbilih, viscosahybrida meißbt, jebe " " Spiraea prunifola II pl. meiße griffiltbi. Spiripaube " Sydonia japonica, tothblühender Wapotensborn. " Tamarix dahurica — elegans indica — germania japonica, tetrandra ME Zamarinbenfträuder finb ihrer fönören 98nm.	21/ ₂ - 1 20 1 71/ ₂ - 3 - 3	5 5 7 ¹ / ₂	empfehle ganz befonders nachstehende Flore, Blatte und Decorations Pflanzen. Auchsten in 100 der besten älteren, neuen n. allerneuest. Sort.	Stat. S gr. t	eth Ith. hir. gr.	
Abolina mermis, Augustajate	2 ¹ / ₂ - 1 20 1 7 ¹ / ₂ - 3 3 - 5 -	5 5 7 ¹ / ₂	empfehle ganz besonders nachstehende Flors, Blatt- und Decorations Pflanzen. Judsten in 100 der besten älteren, nenen n. alleenenspi. Sort.	Std. S gr. t	81th Std. 10 - 5 2	
Abolina merms. Augustagte	2 ¹ / ₂ - 1 20 1 7 ¹ / ₂ - 3 3 - 5 -	5 5 7 ¹ / ₂	empfeste ganz befonders nachstehende Flore, Blatt- und Decorations Pflanzen. Judsten in 100 der besten alteren, neuen n. alleenenest. Sort. beste attere gefüllte n. einfache Sorten in. Namen sache Pflanzen mit Panen.	Std. S gr. t 	eth Ith. hir. gr.	
Anomia merms. Augustająte 12 " 8 " " " hyspiła, votbilib,, viscosahybrida, neigibi, jeże " " piraea prunifola II pl., neige gefülltibi. Spirinabe " Sydonia japonica, retbildipenter Mapoleonsborn. " Tamarix dahurica — elegans indica — germania — japonica, tetrandra — germania — " mite Zamarinbentirtänder find ihrer fajonen Blum. und Befambung wegen febr zu empfellen. Syringa vulgaris, persica, Rothomagensis, Viburnum — Opolus rosea II, pl., Spiraea Sorten a Std. Ulmus maerophyllus fastgirala, herri caprunour	21/2 - 1 71/2 - 3 - 5 - 3 - 3	1 — 5 5 - 71/ ₂	empfeste ganz befonders nachtebende Flore, Blatt- und Decorations Pflanzen. Judsten in 100 der besten alteren, neuen n. alternensch Sort. beste ältere gefüllte n. einfache Sorten in. Namen starfe Pflanzen mit Vannen. nur nenefte gefüllte mid einfache. bochfämmen. Neuene i. ikon. einf. n. gefüllt. Sort.	90 24 90	10 — 5 2 5 21/2	
nobina mermis, Augustazie 12 ", 8 ", ", hyspida, votbilih, viscosahybrida, neifibli, jebe ", 5piraea prunifola II pl., neifie gefülltöl. Spirfandbe ", Sydonia japonica, ertbölfischeret "Apoptensborn". "Tamarix dahurica — elegans indica — germania japonica, tetrandra japonica, tetrandra und Befandung vogen iefti zu empjédien. Syringa vulgaris, persica, Rothomagensis, Viburnum Opolus rosea II, pl., Spiraea Sorten a Std. Ulmus maerophyllus Instigiata, þærf, govinngære puramiðenförmige Illine. " " " Veirella amablis meifilin a 20th 1 thr.	21/2 - 1 20 1 71/2 - 3 3 - 5 - 3	1 — - 5 - 5 - 7 ¹ / ₂ 20	empfeste ganz befonders nachtehende Flore, Blatt- und Decorations Pflanzen. Judsten in 100 der besten älteren, neuen n. alleenenest. Sort. beste ättere gefüllte n. einfache Sorten im Namen sarfe Pflanzen mit Inamen. nur neneste gefüllte mit einfache höchspännin. m. Kronen i. ishön. einf. n. gefüllt. Sort. Verbenen in school. Sort. m. Namen 25 Sch. 1. 25 Sort.	9th S gr. t 20 24 90	8th 9th. 10 - 5 2 5 21/2 - 10 7 ½-30	
Abolina merms. Augustajate 12 ", 8 " " " hyspida, rothfolith, viscosahybrida, netigbil, jebe " " Spiraea prumfola fi pl. netig qefillithi. Spirinube " " Spiraea prumfola fi pl. netig qefillithi. Spirinube " " " Yadonia japonica, rothfolishenter Yadopleensbeuri. " " " Tamarix dahurica — elegans indica — germania japonica, tetrandra " " Mile Zamariubenfirauher finib ihrer fajonen Slum. und Selanbung wegen iebr zu empfehen. Syringa vulgaris, persica, Rothomagensis, Viburnum Opolus rosea fil. pl., Spiraea Sexten a Std. Ulmus macrophyllus fastigiata, herri, gebrungene pyramibenfirming liline. " " Veigelia anabilis, weißlich a Std. 1 thfr. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	21/2 20 71/2 3 5 - 15 - 5 -	1 — 5 5 5 71/2 — 20 — 71/2	empfehle ganz befonders nachstehende Flore, Blatte und Decorations Pflanzen. Senchsten in 100 der besten ülteren, neuen u. allernenest. Sort. beste ättere gefüllte m. einjahe Sorten m. Namen harfe Pflanzen mit Pamen um enerste gefüllte mid einfahe. hochstamm. m. kronen i. schön, i.a. gefüllt. Sort. Verdenen in shont. Sort. m. Namen 200 icht. i.25 Sort. neue gestreifte " j. 1 Me. 15 He. rein femersosse ab dunktersche	90 24 90 - 18 16	8th Sth. Sth. 10 — 5 2 5 2 1/2 — 10 7 ½ - 30 4 2 3 1 1/2	
Anoma merms. Augustająte 12 " 8 " ", " hyspiła, votbilih, viscosahybrida netibil, jebe ", "Spiraea prunifolia II pl. netię gefülltih. Spirinube ", Sydonia japonica, erblölishenter Yadpoleensboru. " Tamarix dahurica — elegans indica — germania japonica, tetrandra Mie Tamarinbenifränder finb ihrer jdjönen Blum. unb Belaubung wegen jebr 31 empiellen. Syringa vulgaris, persica, Rothomagensis, Viburnum Opolus rosea II. pl. Spiraea Zorten a Etd. Ulmus maerophyllus fastigiata, þerti, gederingene puramibenifrantige Illine devingela anabilis, weigifid. Veigela anabilis, weigifid a Etb. 1 tiftr. " rosea, rofenretde.	21/2 1 20 1 71/2 3 - 5 - 15 - 3 - 5 - 3 -	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	empfeste ganz besonders nachstehende Flor:, Blatt- und Decorations Pflanzen. Inchten in 100 der besten älteren, neuen n. alternieste Sort. hefe ätrer gefüllte n. einfach Sorten m. Annen harfe Pflanzen mit Pannen nur neneste griffler und einfach. hochstämm. m. Kronen i. schön. einf. m. gefüllt. Sort. Verbenen in schon. Sort. m. Ramen 25 Sick. 1.25 Sort. m. ten gestreite " 1 1 Me. 15 Me. rein reuerrotse und bunselrotse rein veige nub blaue	90 24 90 — 18 16 18	8th 8th. 10 — 5 2 5 21/2 — 10 7 ½ - 30 4 2 3 11/2 4 2	
Abolina mermis, Augustaigte 12 ", 8 " ", hyspida, rothfilh, viscosahybrida, neifibli, jebe ", Spiraea prunifolia II pl. neifig egfülltől. Spirfiaube ", Sydonia japonica, rothfolischer Yapoleonsborn. " Tamarix dahurica — elegans indica — germania japonica, tetrandra 1 " " Mile Zamarinbenfiränder finb ibrer főjönen Blum. umb Selaubung wegen léte ja empféhen. Syringa vulgaris, persica, Rothomagensis, Viburnum Opolus rosea fi, pl. Spiraca Sorten a Std. Ulmus macrophyllus fastigiata, þerti, görtmigne pyramibenförmige Illine. " görtningen pyramibenförmige Illine a Dyb. 1 thfr. " Groenevegenii " rosea, rofemetője. " Illortensis fl. rubro, buntlefrethe ", Stelzneriana, left verdibfilisch, arofi, buntefrethe ", Stelzneriana, left verdibfilisch, arofi, buntefrethe ", Stelzneriana, left verdibfilisch, arofi, buntefrethe	21/2 - 1 20	1 — 5 5 5 71/2 — 20 — 71/2	empfehle ganz befonders nachstehende Flore, Blatte und Decorations Pflanzen. Indhen in 100 der besten üteren, nenen u. allerennest. Sort. beste ätere gefüllte m. einfache Sorten m. Namen starfe Pflanzen mit Pamen uur neneste gefüllte und einfache. hochstamm, m. kronen i. sich ni. g. gefüllt. Sort. Verbenen in schott. Sort. m. Namen 120 Scht. i. 25 Sort. nene gestreite " j. 1 Me. 15 He. rein seutzende mit damstetreiche rein seutzende mit damstetreiche Sessloten, bellen bilder der der mit Ramen.	90 24 90 — 18 16 18	8th 8th. 10 — 5 2 5 21/2 — 10 7 ½ - 30 4 2 3 11/2 4 2	
Abolina mermis, Augustaigte 12 ", 8 " ",	21/2 - 1 20	1 — 5 5 7 1/2 — 20 — 71/2 — 71	empfehte ganz befonders nachstehende Flore, Blatte und Decorations Pflanzen. Inches in 100 der besten ülteren, neuen n. allennenen. Sort. des eine Blatzen gefüllte nn. einzahe Sorten m. Namen harfe Pflanzen mit Namen tenefte gefüllte und einfache bechflammt. nn. kronen ilchfon. einf. n. gefüllt. Sort. Berdenn in shont. Sort. m. Namen 200 icht. il. 25 Sort. neue gestreifte " 1 1 A. 15 He. rein feuerrothe und dennersche haben dem eine neuersche nut den blane. Herfalze des eine seinen blane. Herfalze des eines kantenann. 12 Sortannen, " Pestargonien, sealest, brennend rothe.	20 24 90 - 18 16 18 18 20	8th Sth. Sth. 10 — 5 2 5 2 1/2 — 10 7 ½ - 30 4 2 3 1 1/2	
Abolina mermis. Augustaigte 12 ". 8 ".", hyspida, rothfilh, viscosahybrida, netifilit, jebe "., Spiraea prunifolia II pl netig egrillith. Spirinube ". Sydonia japonica, criblidhienter Yapoleonsborn. "." Tamarix dahurica — elegans indica — germania japonica, tetrandra "." Mile Zamarimbenfiränder finb ihrer föjönen Blum. und Belanbung wegen jebr 31 empfehen. Syringa vulgaris, persica, Rothomagensis, Viburnum Opolus rosea il. pl. Spiraca Sorten a Std. Umus macrophyllus fastigiata, þerti, goðrungare puramiðenförmige lline "." Veigella anablis, weißitid a Dyb. 1 thfr. " " " " " " " "	21/2 - 20 1 71/2 - 3 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	1 — 5 5 7 1/2 — 20 — 71/2 — 71	empfeste ganz besonders nachstehende Flore, Blatt- und Decorations Pflanzen. Indisten in 100 der besten älteren, neuen n. alterneich Sort. her fie ältere gefüllte n. einfach Sorten m. Aumen harfe Pflanzen mit Vannen nur neneste gefüllte und einfach hochstämmt. n. Aronen lichon. einf. n. gefüllt. Sort. Verbenen in sigden. Sort. m. Ramen 25 Sick. 125 Sort. neue gestreiste """" 1 Me. 15 Me. rein reuerrothe nib dunsetrothe rein verige und blane ferlotrop, helle n. dunstsfarbig 12 Sorten mit Nannen. Lantanen, "" 20 and ein 50 diteren n. neuen, gefüllten u einfachen	90 24 90 - 18 16 18 18 20 20	Side State. Sta	
Abolina merms. Augustaigte 12 ", 8 " ", hyspifa, rothfolih, viscosahybrida, netifibil, jebe ", Spiraea prunifolia I pl. netife gefülltöl. Spirinube ", Spiraea prunifolia I pl. netife gefülltöl. Spirinube ", Sydonia japonica, rothfolifienber Wapotleensborn. " Tamarix dahurica — elegans indica — germania { japonica, tetrandra Uffe Zamarinbenfiränder finb ibrer föjönen Blum. und Belanbung wegen iebr ja emipfelien. Syringa vulgaris, persica, Bohtomagensis, Viburnum Opolus rosea fl. pl., Spiraea Sorten. a Setd. Ulmus macrophyllus fastigiata, herri, görningene puramibenförmige Illime. Veigella amablis, norifitid. a Dib. 1 thfr. " Groenevegenii " rosea, rofurutotje. " Hortensis fl. rubro, bunteltetip. " Hortensis fl. rubro, bunteltetip. " van Huttei, föjön volb. " Wille Beigelien finb iföjöne Stränder) Jowie berfdieb. ambere gutte Sierbäume in Stränder 12 Setd. i. 12 gut. Sort. m. Vann. 1 bftr., 25 Sid. besel. 1 thfr.	21/2 - 20	1 — 5 5 7 1/2 — 20 — 71/2 — 71	empfeste ganz besonders nachstehende Flore, Blatt- und Decorations Pflanzen. Indhsten in 100 der besten alteren, neuen n. allerniensche Sort. handsten in 100 der besten mit Vamen siere Pflanzen mit Vamen sorte Minister und neuersche Gorten m. Annen sorte Bilanzen mit Vamen sinfage. Hand beschäftlich mit sie der Verleicht und der Verleichte der Verle	Stat.	2 10 — 5 2 1/2 — 10 7 1 - 30 4 2 4 2 4 1 2 4 2 4 1 2 6 3 - 71/2	
Abolina mermis. Augustaigte 12 ". 8 ".", hyspida, rothfilh, viscosahybrida, netifilit, jebe "., Spiraea prunifolia II pl netig egrillith. Spirinube ". Sydonia japonica, criblidhienter Yapoleonsborn. "." Tamarix dahurica — elegans indica — germania japonica, tetrandra "." Mile Zamarimbenfiränder finb ihrer föjönen Blum. und Belanbung wegen jebr 31 empfehen. Syringa vulgaris, persica, Rothomagensis, Viburnum Opolus rosea il. pl. Spiraca Sorten a Std. Umus macrophyllus fastigiata, þerti, goðrungare puramiðenförmige lline "." Veigella anablis, weißitid a Dyb. 1 thfr. " " " " " " " "	21/2 - 20	1 — 5 5 7 1/2 — 20 — 71/2 — 71	empfeste ganz besonders nachstehende Flore, Blatt- und Decorations Pflanzen. Indhen in 100 der besten ätteren, neuen n. allerneich Sort. höhen ihre gefällte n. einjade Sorten m. Annen sort Pflanzen mit Vamen sort wir der Schalten in der Schalten in indhen Sorten m. Annen 150 det. i. 25 Sort. men gefüreite " 1 Me. 15 Hr. rein seinersche mid dane einfache rein weiße und blane rein weiße und blane Sessiotrop, self- n. danelsfardig 12 Sorten mit Nauen. Lansanen, " 12 " " " " " " " " " " " " " " " " "	Stat.	2 10 — 5 2 5 2 1/2 — 10 7 1 - 30 4 2 4 2 4 1 2 2 4 3 - 7 1/2 6 3 — 7 1/2	

-			12 含t点	100 21d	1 Stdt.	
		Batunia hubrida 4 nl. Hafaërtnar Lacamann hellraia	gr.	thir.	gr.	
		Petunia hybrida fl. pl., Hofgärtner Lesemann, hellrofa- mit purpur reich überadert, innen dunkler, nach oben lichter				
		innen dunfler, nach oben lichter Gustav Wesser, zurt hellrofa,	45		5	
		" " Gustav Wesser, zart hellroja, nach innen lichter " Adolf Weick, ichon blanviolett				
		mit rein weißen Flammen				
2		Me 3 Sorten find fehr groß, starf gefüllt. Penstemon, Hartw., in 12 schönen Sorten	25	-	21/2	
		Veronica hybrida, " 9 " "	25 30	-	21/2	
		Abutilon, in ichonen neuen Gorten	45 15	-0	5 11/2	
		Aechyranthus Verschasselli, mit blutrothen Blättern fol. aur. ret., d. grünen Blätt.				
		hilbid gelb gez., Stengel roth Alternanthera, amoena, spatulata & versicolor, alle 3	16		11/2	
		Alternanthera, amoena, spatulata & versicolor, alle 3 Sorten ichon zu Einsass, bei Parthien i. Rasen, 2-4" h. Alyssum saxatela fol. varg. (Koniga variegata), die flein.	15	3	21/2	
		gelinen Blätter scharf mit weiß begrenzt. Artemisia anna, s. St. Petersburg, beides Chypressen üsche Sommergendässe, mit scharfter Belandung, " " judaica, mit silbergrauer Beland, sehr becorativ, nen, " " processe und Schampelin mit Schampel 1983 (28 ternil).	15	3	21/2	
		liche Sommergewächse mit feiner Belaubung	15	-	2	
			24 20	4	$2\frac{1}{2}$ $2\frac{1}{2}$	
		Rambuca Fortunai variage viert miche meingefte Rorret	15	2	$\frac{11/2}{71/2}$	
		Boccoma Japonica, t. Arreien ausoanernoe guviaje Statipit.	45		5	
		Canna discolor und verschiedene Sorten angetrieben	50		5	
		"12 Sorten mit Ramen, angetrieben	60	3	71/2	
		Coleus Verschaffeti, d. braunen Blätter m. griner Kante " marmorata. Die Blätter grün und roth marmoritt	18 18	31	$\frac{2^{1}}{2}$	
12		"Gypsoni. Blätter griin mit dunffer Kante	18	3	21/2	
		marmorata, die Blätter grün und roth marmorirt "Gypsoni. Blätter grün mit dunkler Kante "die 13 Sorten 68r Neuheiten a 1 Sit. 1 Re. "12 69r "a 1 Sit. 1 Re. 15 Feb.	-	-	5	
		93 Soutan a 1 Stat 2 Re				
		Centaurea candidissima, mit glänz, filberweißen Blättern "gymnocarpa, mit gesiederten Cerastium Bibersteini & tomentosum, mit weißfüßigen	50 50		5 5	
		Cerastium Bibersteini & tomentosum, mit weißfilzigen	15	3	11(0	
			20	4	$\frac{21 _{2}^{2}}{21 _{2}}$	
		Echeveria secunda, rosettenartige E., rothblühend	20	-	21/2	
		Erithrina crista galli Farfugium grande, die großen Blätter halb gestedt Funkia undulate fol. varieg , m. weißgestr. Blätt., schön	30 30	6	4 3	
		Funkia undulate fol. varieg , m. weißgestr. Blatt., schon Gynerium argenteum, befanntes prachtvolles Bompasgras	45 50	-	5 5	
		Hortensien für ichottige (Sruppen	20	3	21/2	
		"Hydrangea Hortensis Otaksa, d. Blumen dief. Neuh. follen sich 1/4 Jahr an den Pflanzen frijch halten. Gazania splendens, bildet sich niedr. m. herrl. gelb. Blum.	70	-	71/2	
		Gazania splendens, bildet fich niedr. m. berri, gelb. Blum. Gnaphalium lanatum, ausgezeichnet m. weißfilzigen Blatt.	18 15	31	2 2	
		Gasphalium lanatum, ausgezeichnet m. veihflütgen Blätt. Ligularia Kaempherii, arg. marg., groß, grilli leberartige Blätter mit weißer Guindntung. Lencophyta Browni, sehr zierlich mit sein veräsielten	60		71/2	
		Leucophyta Browni, sehr zierlich mit fein beräftelten	20	1		
		filberweißen Blättern und Zweigen	24	4	21/2	
		Mentha variegata, d. grün. Blätt. weißeingef., oft ganz weiß,	12	2	11/2	
		Lovena ingens, in. 1013. In cross, Sinat, in Justical, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 22	12	21	11/2	
		Oxalis tropacoloides. braunblätt. Alee m. geld. Bl. 3. Einfass. " viridisolia, Neuheit m. grünen Blättern " und gelb. Blann., beide vorzügl. s. Teppichbeete	10	13	1	
		" und gelb. Blum., beide vorzügl. f. Teppichbeete	30	-	4 2	
		Perilla nankinensis, mit dunfelgrünen Blättern	30	11	3	
2		Phormium tenax, m. ungerreigbar, ichwertform. Blattern 12 Sta. 90-150 Mg.	_	-	10	
		Poa trivialis fol, varieg., gierl, ichon weiß bandirte Grasart	15 30	3	11/2	
		Polygonum Seiboldi, 8' hoch werd., als Einzelpfl. vorzügl. Polemonium coeruleum fol. varg.	30	-	3	
		Polemonium coeruleum fol. varg. Pyretbrum parthenifolium aureum. m. goldgelben Blät- tern, ganş vorşüglidi für Teppidberte Ricinus atrosanguineus, riel jüğür Blattyll. b. 12'b. werb.	30	6	3	
		Salvia argentea, mit großen inverweißen figigen Sidtt.	18 35		$\frac{21/2}{4}$	
		Selinum decipiens, fehr fichon, einem Baumfarrn abnt.	15	9	71/2	
		" Fabarium, mit rothlicher großer Blumendolde	24	-	$\frac{11}{2}$ $\frac{21}{2}$ $\frac{21}{2}$	
		Santelina tomentosa, m. weißer enpressenform. Belaub.	1	-	3	
		Stachyo lanata meinhlättnia au miehvigan (Symmon I	45 20	5	5 21/2	
		Tassilago farfara fol. varig., jehr jajon	45 60	_	5 6	
		Vinca elegantissima, b. glanz.grün.Blatt.gelbeingef. j. ichon	$\frac{25}{71/2}$	3 2	21/2	
		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	20	5	21/2	
		" "Nouve Quen Ten, werden fast nicht höher	40 30	6	4 3	
		" Purple Quen als 3-4" Yucca filamentosa, fiarfe Bflansen 15 far 1 Re	30	6	71/2	
		Zea japonica fol. varg., buntblättr. Mais, fehr becorativ	15	2	21/2	
2		200 jeponica loi. varg. onitionatri. Waits, jept decorativ "sp. gracillima. Reuhicit, jehr compact, wird nicht über 3 Juß hoch und hat die Blange, weil sie in Kords-Deutlischand nicht zur Blitche fommt, den ganzen Sommer ihr schönes Ansehen.				
0		gangen Sommer ihr ichones Ansehen	2		5	
		Grege Auftrage auf vorftebende Cachen er-				
2	1	bitte möglichft fruh, um biefelben vollfommen				
		geschätten Buftragen über 10 Thir., welche				
		bis jum 1. April hierauf eingehen, 10 Procent				
		Nabatt.				

(Fortfetjung auf beiliegendem Blatt.)

Annemona hepatica fl.coerulea pl., gef. blanes Leberblümd.	20 - 2	Primula Aurikula, jájönfte Sort. a Dhd. 1 Me, gute Sort. "veris, Gartenprimef	12 100 1 Stdt. Stdt. Stdt. gr. tipir. gr. 10 12 1 8 15 1 2 1/3 1/2 5 1 1 18 4 2 1/2 50 — 5 — 10 — 5
Arabis albida, weißbfühend Armeria maritima, englisses Gras Bellis perennis fl. pl., Taniendschöndsen, weiß, rosa, disroth " " " 6 nene vorzüglich großblumige Declitra speetabilis, gebrochenes Franenherz " fl. albo, weiß. " Dianthus barbatus fl. pl., gef. Bartnesse, verschied. Farb. " cariophyllus remt. fl. pl. L'Grenadier " " Souvenir de la Malmaison, Farbe wie die befannte Prachtrose " fl. pl., extra gefüllte Gartennessen, 12 Sort. mit Namen und Karbe	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	"Marie Louise, himmelblau, gefüllt "fl. rubro pleno & fl. tricolor pleno, jede "tricolor maxima, großblumigste Stiefmüttchen in 40 der vorzüglichsten Sorten, in kräftigen Pslanzen nach meiner Wahl. nur Rangblumen in extra Auswaßl oder nach Vasaßt des Isestellers. Standen, schönblühende, 12 Sorten mit Namen 25 "Inkann zu Enfast. a Ihn 21/2" Ext, womit man ca. 12 Juß einsaßt. ann. Größere Guantums bistiger. Ephen, großblättr. (in Töpfen) z. Beliede. v. Grabhügeln u.s.w. a Std. 21/2—10 Hr. a Dh. 1.—3 Re. " von 2—5' hoch mit 2—5 Kanken.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
" " beste gesüllte Senker " Samennessen, siesen 3/4 schön gesüllte " Samennessen, siesen 3/4 schön gesüllte " Schotten	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Unemonen, beste gesüllte in schönen Kommeln Ranuntel, gestüllte, in vielen Farben gemischt. Baussingaultia baselloides, z. Besseid v. hängend. Gnirs. Begonia discolor Canna discolor a Dtd. 1 Re 15 Mr, verschied. Sorten " in 12 schönen Sorten mit Rannen Georginen und Gsadiosen (f. S. 3.) Gloxinia hybrida; in schönen Formen und Farben Lilium candidum, weiße Liste " giganteum, Riesensstie vom Simasaha-Sebirge. Oxalis heteraphylla, eignet sich zu Einsassungen. Tigridia Pavonia, Tigerssise Tritonia aurea.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Bon Mitte August jeden Jahres ab liefere

Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Tazetten, Jonquilen, Narcissen etc. fomohf für Töpfe wie für's freie Land in I. Qualität zu billigsten Preifen.

Primula chinensis fl. albo & fl. rubro pl.,

ab Mai in kleinen Töpfen à Dto. 1 Re. 100 Std. 7 Re., ab Angust n. September schöne Pflanzen à Dto. 143 Re. 100 Std. 10-14 Re.

ljährig, a Schock 15 Igr., 1000 Stück 4 Re.

F ANZEN

von Gemüfe, Runkelruben, Wruken oder Steckruben halte von April bis Juli einen großen Borrath und verlaufe folche zu möglichst billigen Preisen.

gemischt a Schod 3 Gr, fortirt gu berschiedenen aber billigen Breisen.

Levkojen=Pflanzen

fraftig, a Schod 4 und 6 Sgu, nur von extra gefüllten Samen in allerbefter Mifchung.

PHISTIZED. Aminge Hecken: WIDER

breijährige, aus Samen gezogen, 100 Stück 25 Sgr., 1000 Stück 8 Thr. wie die aus ben Balbern. — Bei größeren Quantitäten tritt eine Preis-Ermäßigung ein. Bedeutend beffer wie die aus den Balbern.

LIGUSTRUM

100 Stild 20 Sgr., 1000 Stild 6 Thir.

Bouquets and Kränze

von frischen und getrodneten Blumen liefere ich in allen Formen auf das Geschmadvollste zu möglichst billigen Preisen.

BRAUT-KRANZE werden, auf Bestellung, modern, von ichoner Myrthe und in fürzester Zeit gebunden.

Abgeschnittene Anrthe zu Braut-Kränzen a Loth 4 Sgr.

Auf alle in diesem Verzeichnisse nicht aufgeführten Artikel nehme ich Bestellungen an und werde solche zu möglichst billigen Preisen auf's Gewissenhafteste ausführen.

Auch bitte ich höflichst alle geehrten Empfänger dieses Verzeichnisses, dasselbe bekannten Gartenliebhabern zur Auswahl ihres Bedarfs zu empfehlen.
C. L. KLISSING SOHN.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer